

Zur
Berechnung der Proximitäten von
Asteroiden-Bahnen.

Inaugural-Dissertation

welche mit Genehmigung

der

philosophischen Facultät hiesiger Universität

zur Erlangung der Doctorwürde

am Mittwoch den 28. März 1883, Vormittags 11 Uhr

in der kleinen Aula

öffentlich vertheidigen wird

Andreas Galle,

Assistent a. d. Kgl. Sternwarte.

Opponenten:

G. Lachmann, Assistent a. d. Kgl. Sternwarte.

L. Lübeck, Cand. math.

H. Reitzenstein, Gerichts-Referendar.

Breslau.

Druck von Grass, Barth & Comp. (W. Friedrich.)

Seinem geliebten Vater

in inniger Verehrung und herzlicher Dankbarkeit

zugeeignet

vom

Verfasser.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die Frage nach der Möglichkeit einer Annäherung oder eines Zusammenstosses zweier Weltkörper hat, wie es scheint, ihren Ausgang von den Cometen genommen. Zwar hatten die „*Principia mathematica philosophiae naturalis*“ sie als Wandelsterne dem allgemeinen Gesetze der Bewegung untergeordnet, aber die abergläubische Furcht vor etwaigen schädlichen Einflüssen derselben war nicht gewichen, sondern fand in der Möglichkeit einer Annäherung der ihrer physischen Natur nach räthselhaften Himmelskörper an die Erde neue Nahrung.¹⁾ Bereits Halley, Newtons berühmter Schüler und Freund, beschäftigte sich mit dieser speciellen Frage, ob unser Planet Begegnungen mit Cometen ausgesetzt sei.²⁾ Er hielt solche nicht nur für möglich, sondern erklärte dadurch frühere Veränderungen auf der Erdoberfläche. Whiston, Heyn und Maupertuis führten diese Ideen weiter aus und gaben ihnen Verbreitung.³⁾ Ihnen gegenüber glaubte Lambert aus der weisen Einrichtung des Weltganzen schliessen zu dürfen, dass wie bei den Planeten durch die Anordnung der Bahnen der Cometen

¹⁾ Eine ausführliche Darstellung der älteren Geschichte dieser die Cometen betreffenden Frage giebt Olbers in der *Mon. Corr.* v. *Zach* XXII, pg. 409, und *Astr. Nachr.* VI, 128, pg. 165. Ebendaher sind die folgenden Literaturangaben zum Theil entnommen.

²⁾ Halley „Some considerations about the cause of the universal deluge“ und „Some further thoughts upon the same subject“ *Philos. Transact.* Nr. 383, pg. 118, 123.

³⁾ Die 5 Auflagen (1696—1737) der von Clüver ins deutsche übersetzten „*Neuen Theorie der Erde*“ von Whiston beweisen die Allgemeinheit des Interesses. Maupertuis in seinem Briefe: *Ueber den Cometen von 1742.* Ueber Whiston vergl. *Pingré Cométographie* Bd. II, über Heyn Olbers citirte Abhandlung.

eine verderbliche Wirkung ausgeschlossen sei.⁴⁾ Im Jahre 1773 wandten sich auch Lalande und Prosperin der Frage zu⁵⁾ und kurz darauf suchte Du Séjour die Möglichkeit von Zusammenstößen und damit die Gefahren, welche nach Maupertuis und Lalande in ihrem Gefolge stehen sollten, als höchst unwahrscheinlich in Abrede zu stellen.⁶⁾ Olbers zeigte freilich, dass seine Rechnung auf einem Trugschluss beruhe, und Laplace behauptete von neuem die Möglichkeit des Ereignisses.⁷⁾ Jedoch gelangten Olbers, Arago u. a. zu demselben Resultat, dass die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung äusserst gering sei.⁸⁾

Durch derartige Untersuchungen und mit der wachsenden Erkenntniss der physikalischen Eigenschaften der Cometen verlor die Untersuchung der Annäherung der Cometen an die Erde viel von ihrem anfänglichen Interesse, um bei einer Gruppe neu entdeckter Himmelskörper in anderer Form aufzutauchen.

4) Lambert, Kosmologische Briefe über die Einrichtung des Weltbaues. Augsburg 1761.

5) Lalande, *Réflexions sur les comètes qui peuvent approcher de la terre*. Paris 1773. Prosperin, *De inveniendis punctis proximis parabolae et circuli circa eundem focum descriptorum* 1773; ferner in *Abh. d. K. Schwed. Akademie der Wissensch.* 1775, übersetzt v. Kästner, Bd. XXXVII, pg. 189, u. 1785, übers. v. Kästner u. Brandis, Bd. VI, pg. 256.

6) *Essay sur les comètes en général et particulièrement sur celles qui peuvent approcher de l'orbite de la terre*. Par M. Dionis du Séjour, Paris 1775, s. auch Pingré *Cométographie* Bd. II.

7) Olbers a. a. O. Laplace, *Exposition du système du monde* 3^{me} éd. Paris 1808. Bd. II.

8) Olbers a. a. O. u. *Astr. N.* IV, pg. 501. Arago, *Pop. Astr.*, übers. v. Hankel, II, pg. 386. S. auch Hind, „die Cometen“, übers. v. Mädler 1854, pg. 27 (Zusammenstellung der Cometen, die der Erde nahe kamen) und Zusatz IV (über den Zusammenstoss eines Cometen mit der Erde). Ueber die angebliche Verfinsterung des Mondes durch den Cometen v. 1454 vergl. u. a. Humboldt *Kosmos* III, pg. 565, v. Zach, *mon. Corr.* XXIII, 1811, pg. 196–202. Arago, *Pop. Astr.* II, pg. 334. (Eine solche Verfinsterung ist neuerdings durch den grossen September-Cometen 1882, der vor der Sonne verschwand, noch unwahrscheinlicher geworden.) — Ueber die Annäherung des Lexell'schen Cometen an das System des Jupiters vergl. *Kosmos* III, pg. 566. Le Verrier in *d. Compt. Rend.* XIX, 1844, pg. 982–993. Ueber die Cometen von Encke u. Biela J. Littrow in *Baumgartners Zeitschrift f. Physik* I, pg. 41.

Historische Uebersicht der Untersuchungen über die Asteroiden.⁹⁾ Die Entdeckung der Ceres am ersten Tage dieses Jahrhunderts richtete die Aufmerksamkeit der Astronomen auf einen Punkt, wo neue Probleme ihnen ein reiches Arbeitsfeld eröffnen sollten, auf den Zwischenraum zwischen Mars und Jupiter, wo bereits Kepler mit bestimmten Worten einen Planeten angenommen hatte.¹⁰⁾ Bereits an die Aufindung der ersten vier dieser Himmelskörper knüpfte sich die Frage nach ihren gegenseitigen Lagenverhältnissen. Die nicht erfüllte Erwartung, einen einzigen grossen Planeten zu finden, und der zufällige Umstand, dass sie nahe an derselben Stelle des Himmels gefunden wurden, legten die von Olbers aufgestellte, von Zach vertheidigte Hypothese nahe, dass die entdeckten nur Trümmer eines ehemaligen grossen Planeten seien. Die von Gauss und auf dessen Veranlassung von Encke angestellten Rechnungen machten diese Annahme sehr unwahrscheinlich, die immerhin, wie man weiss, der Astronomie einen guten Dienst erwiesen hatte.¹¹⁾

Mit der Zunahme der Entdeckungen in der zweiten Hälfte des gegenwärtigen Jahrhunderts und bei der geringen Ausdehnung des Raumes, auf den der ganze Planetenring beschränkt blieb, machte sich das Bedürfniss immer mehr fühlbar, eine Uebersicht der räumlichen Vertheilung der einzelnen Planetenbahnen zu gewinnen. Einige versuchten die Olbers'sche Hypothese auch nach der Entdeckung weiterer Glieder der Planetengruppe aufrecht zu halten.¹²⁾ Diesen Untersuchungen

⁹⁾ Den von Herschel d. ä. eingeführten Namen „Asteroiden“ (cf. Gould on the orbits of the asteroids) werde ich mit der vom Berl. astr. Jahrbuch acceptirten Bezeichnung „kleine Planeten“ unterschiedslos gebrauchen.

¹⁰⁾ *Mysterium cosmogr.* 1596, pg. 7. *Opera omnia* ed. Ch. Frisch, Bd. I, pg. 107.

¹¹⁾ Olbers im Berl. astr. Jahrbuch 1805, pg. 108. Mon. Corr. VI, pg. 88. v. Zach in Mon. Corr. X, pg. 377.

¹²⁾ Mauvais: *Compt. Rend.* XXII, 1846, pg. 157. Daniel Kirkwood suchte sogar den Urplaneten aus seinen Theilen wieder herzustellen: *Report of the British Association* 1850, pg. XXXV. cf. Humboldt *Kosmos* III, pg. 550, Note 67. Mit demselben Gegenstand beschäftigten sich Plana, Callandreau u. a. (Vergl. die Literatur in Houzeau et Lancaster *Bibliographie de l'astronomie.*)

von vorzugsweise historischem Interesse gegenüber liegen die von B. A. Gould „über die gegenseitige Lage der Bahnen der zwischen Mars und Jupiter sich bewegendenden Planeten“ (Göttingen, 1848) unserer Aufgabe näher. Ausser einer Vergleichung der Bahnelemente der damals bekannten 8 Planeten und dem nicht uninteressanten und von Olbers bereits bei Ceres und Pallas bemerkten Resultat, dass die Bahnlinien wie Kettenringe zusammenhängen, findet sich auch eine Besprechung ihrer Annäherungen in den gemeinsamen Schnittlinien. Diese Arbeit erfuhr in der Habilitationsschrift von D'Arrest¹³⁾ eine Erweiterung, einestheils durch Berührung noch einiger anderer Fragen, dann aber durch die Untersuchung derselben Punkte bei der vermehrten Anzahl von 13 Planeten. Unter den die Topographie der Asteroidenbahnen betreffenden Abhandlungen seien noch die von Kirkwood und Hornstein hervorgehoben, „The asteroids between Mars and Jupiter“ und „Beitrag zur Kenntniss des Asteroidensystems“ betitelt.¹⁴⁾ Beide haben die Vertheilung der Bahnelemente und der Grössenverhältnisse der Asteroiden nach ihrer Entfernung von der Sonne zum Gegenstand und liegen daher ausserhalb des Bereichs der vorliegenden Betrachtung. Doch habe ich sie hier erwähnt, um später auf die erstere Arbeit zurückzukommen.

Gould und D'Arrest hatten die kürzeste Entfernung zweier Bahnlinien ohne weiteres in die Schnittlinie beider Ebenen verlegt.¹⁵⁾ Dies ist aber bei Bahnen, deren Ebenen nur wenig gegen einander geneigt sind, nicht gestattet. Grunert behandelte dagegen die Frage in Strenge vom mathematischen Gesichts-

¹³⁾ Ueber das System der kleinen Planeten zwischen Mars und Jupiter von Dr. L. D'Arrest, Leipzig 1851.

¹⁴⁾ Die erstere im Smithsonian Report 1876, pg. 358, die andere in den Sitzungsbericht. d. k. Akademie der Wiss. Wien 1881. LXXXIV, Abth. II. Juni-Heft, ein kurzes Resumé in Schlömilch Zeitschr. f. Math. u. Phys., Jahrgang XXVI, 1881, pg. 394. Hierher gehören auch die Aufsätze von Newcomb in Astr. Nachr. 1746 und Kirkwood Monthly Not. XXV, 1875, pg. 62. Vergl. auch S. Newcomb, Popular Astronomy Part. III, Chapt. III, pg. 323. The small planets.

¹⁵⁾ Prosperin und Du Séjour waren die einzigen, die diese Annahme nicht machten; sie setzten dagegen bei ihrer Bestimmung der Annäherung von Cometen an die Erdbahn die letztere als kreisförmig voraus.

punkte, doch liess er die Rücksicht auf eine wirkliche Berechnung zurücktreten und auch ein grösseres mathematisches Interesse dürften seine Resultate ihrer Complication wegen nicht beanspruchen.¹⁶⁾ Kurz sei nur erwähnt, dass er sich der Mittelpunktsgleichungen für die beiden Bahnellipsen bedient, sie auf ein und dasselbe, im übrigen nicht fixirte Coordinatensystem bezieht, jetzt erst die Bedingung des gemeinsamen Brennpunktes einführt und nun die Eingangs für zwei beliebige Curven aufgestellten Bedingungen für die Proximität anwendet. Dasselbe wird für den Fall durchgeführt, dass die Bahnen andere Kegelschnitte als Ellipsen sind. In einer zweiten Abhandlung¹⁷⁾ bestimmt Grunert die rechtwinkligen Coordinaten der Durchschnittspunkte zweier Bahnen und stellt eine Bedingungsgleichung für ihre Existenz auf. Auch hier eignen sich die Endgleichungen nicht zu wirklicher Ausrechnung.

Die auf engen Raum beschränkte, von Jahr zu Jahr durch neue Entdeckungen sich vergrössernde Gruppe von Planeten, die ihren Dimensionen nach nur mit den Trabanten der Hauptplaneten rivalisiren konnten, hatte zuerst die Frage nach ihrem Ursprung nahe gelegt. Als sich die Hoffnung, ihre Entstehung aus einem Urplaneten zu erklären, trügerisch erwies, betrachtete man sie isolirt und suchte das Gesetz ihrer Vertheilung im Raume zu entdecken. Bei beiden Betrachtungsweisen trat die Frage in den Vordergrund, ob verschiedene Bahnen sich einander beträchtlich näherten, dort, um den Schluss auf die Vergangenheit zu vermitteln, hier aus dem geometrischen Interesse an den in mannigfaltiger Weise sich durchkreuzenden Bahnen gleichzeitig die Sonne umkreisender Gestirne. Im Anschluss daran trat als ein neues Moment die mögliche Einwirkung der Asteroiden auf einander hinzu und damit eine Veränderlichkeit der Bahnelemente durch Störungen anderer als der grossen Planeten, die bei der Unbekanntschaft

¹⁶⁾ Ueber die Proximitäten der Bahnen der Planeten und Cometen. Sitzungsber. d. math.-naturw. Cl. der k. Akad. d. Wissensch. Bd. XIII, pg. 38. Wien 1854.

¹⁷⁾ Directe Bestimmung der Durchschnittspunkte der Bahnen zweier in Kegelschnitten sich um die Sonne bewegendem Weltkörper. Denkschriften d. Ak. d. Wiss. in Wien 1861. Bd. XIX.

mit den Massen der Körper nicht in Rechnung gezogen werden, andererseits aber zu einer Erkenntniss ihrer Massenverhältnisse führen können.

Diesen letzteren Gesichtspunkt hatte besonders Karl von Littrow im Auge, als er sich im Jahre 1853 der vorliegenden Frage zuwandte, die ihn während zwei Decennien beschäftigt hat. Durch die Voraussagung thatsächlich stattfindender Proximitäten¹⁸⁾ suchte er die Aufmerksamkeit der Astronomen auf etwa bemerkbare Einwirkungen zu lenken. Wenn seine Bemühungen, soweit mir bekannt ist, noch nicht den gewünschten Erfolg gehabt haben, so ist der Grund wohl darin zu suchen, dass Annäherungen auf sehr kleine Entfernungen eben nicht stattgefunden haben oder dass die Planeten zur Zeit der Proximität nicht beobachtet werden konnten.

Um die Punkte zu erkennen, bei denen eine Neubearbeitung des Gegenstandes beginnen musste, und die Mängel zu beurtheilen, die auch nach den Methoden von Littrow und Linsser (dessen Verfahren mir nur durch Littrow's Abhandlungen bekannt geworden ist) zurückblieben, scheint es mir nöthig, in einem I. Theile eine kurze Analyse dieser Arbeiten einem im II. Theile gegebenen Versuche vorangehen zu lassen, der eine strenge Lösung der vorliegenden Aufgabe bezweckt. Der III. Theil enthält dann einige numerische Anwendungen und Beispiele des im zweiten angegebenen Verfahrens.

I.

1. Erste Methode von Littrow. Bevor Littrow die von ihm zur Berechnung der Proximitäten wirklich angewendeten Methoden einschlug, stellte er diejenigen Ausdrücke zusammen, durch welche die Aufgabe in aller Strenge gelöst werde und die hier in Kürze folgen sollen.¹⁹⁾

¹⁸⁾ Ausser den in Note 19 und 23 anzuführenden Arbeiten in den Sitzungsbericht. der math.-naturw. Cl. der k. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Bd. XXXIX, XLIII, XLV, XLVII, XLIX, LI, LIV, LVI.

¹⁹⁾ Bahnnähen zwischen den periodischen Gestirnen des Sonnensystems. Sitzungsber. der math.-naturw. Cl. der k. Akad. d. Wiss. Bd. XIII, pg. 38. Wien 1854.

$$\begin{aligned}
2 a_1^2 e_1 - 2 a a_1 e A &= \beta \cos C \\
- 2 a a_1 \sqrt{1 - e_1^2} e A' &= \beta \sin C \\
2 a a_1 \sqrt{1 - e_1^2} A' &= \beta' \sin C' \\
- 2 a a_1 \sqrt{1 - e_1^2} A'' &= \beta'' \cos C''^{22)}
\end{aligned}$$

a, a_1, e, e_1 bezeichnen die halben Axen und die Excentricitäten der beiden Bahnen. Aus E und E_1 erhält man auf bekannte Weise die wahren Anomalieen v und v_1 und ohne weitere Schwierigkeiten lässt sich dann die Distanz Δ bestimmen. Es kommt nur auf die Auflösung der Gleichungen (a) nach E und E_1 an.

Die Einführung etwas anderer Hilfsgrößen an Stelle der A u. s. f., wenn mehrere Planeten mit ein und demselben zu combiniren waren, übergehe ich hier als nebensächlich.

Von diesem Versuch einer strengen Lösung nahm Littrow gänzlich Abstand, weil sich die praktische Durchführung bei diesem Verfahren äusserst complicirt gestalte. Nach einer vergeblichen Umschau nach anderen Wegen bin ich gleichwohl zu demselben Princip zurückgekehrt und habe im II. Theile ein zum Ziel führendes Verfahren angegeben, wobei sich Gelegenheit bieten wird, auf einzelne Punkte des vorstehenden zurückzukommen.

2. Andere Methode von K. von Littrow. Nachdem Littrow die genauen Formeln verlassen hatte, musste er sich begnügen, näherungsweise zum Ziel zu gelangen.²³⁾ Um zunächst solche Combinationen von Asteroidenbahnen herauszufinden, bei denen kleine Bahnnahe statthätten, bediente er sich anfangs eines aus Drähten hergestellten Modells der Bahncurven. Eine engere Auswahl wurde sodann durch Zeichnungen ermöglicht. Da jede wirkliche Bahnnahe im Gegensatz zu einer für irgend einen Beschauer scheinbaren dadurch gekennzeichnet ist, dass die Projectionen der kürzesten Entfernung auf drei zu einander senkrechte Ebenen kleiner (höchstens eine gleich) wie sie selbst

²²⁾ Der Factor 2 hätte füglich überall fortbleiben können.

²³⁾ A. a. O. s. Note 18, Denkschriften der k. Akad. der Wissensch., math.-naturw. Cl. XVI, Wien 1859. Physische Zusammenkünfte der Planeten (1)–(42) während der nächsten Jahre. Denkschr. XXXI, pg. 157. Physische Zusammenkünfte der Planeten (1)–(82) während der nächsten Jahre. Wien 1871.

sind, so würden drei Zeichnungen für jeden Planeten darüber entscheiden. L. begnügt sich mit 2 Projectionen jeder Bahn,²⁴⁾ einmal auf die Ekliptik und zweitens auf eine zu dieser senkrechten Ebene (beiläufig den durch 0° und 180° Länge gehenden Breitenkreis). Je zwei der beiden für jeden Planeten auf eine Bause übertragenen Zeichnungen wurden auf einander und auf einen Ekliptikalkreis gebracht und ergaben auf sehr einfache Weise, wenn sie in demselben Massstab entworfen und in gleicher Weise orientirt waren, die Länge der Ekliptik, für welche in beiden Projectionen die Bahnpunkte eine unter einer bestimmten Grenze liegende Entfernung hatten. Von diesen konnte dann angenommen werden, dass sie einer wirklichen Proximität entsprechen.²⁵⁾

Jetzt waren zwei Möglichkeiten vorhanden. Entweder wich die gefundene Länge L der Proximität unbedeutend von der Länge der Durchschnittslinie der beiden Bahnebenen ab oder nicht. Hierüber entschied eine kurze Rechnung. Sind nämlich i, i_1 die Neigungen, Ω, Ω_1 die Knotenlängen der beiden Bahnen und werden mit U und U_1 die der Schnittlinie in den beiden Bahnen zukommenden Argumente der Breite bezeichnet, so wendet Littrow unter Einführung einer Hilfsgrösse q durch

$$\operatorname{tg} q = \frac{-\operatorname{ctg} i_1}{\cos (\Omega_1 - \Omega)} \text{ die Formeln}$$

$$\operatorname{tg} U = \frac{\operatorname{tg} (\Omega_1 - \Omega) \cdot \cos q}{\cos (i - q)}$$

$$\operatorname{tg} (l - \Omega) = \operatorname{tg} U \cos i$$

an. Ergab sich hieraus $L - l$ klein, so nahm Littrow die Proximität in der Knotenlinie an, wie es die früheren Bearbeiter des Problems in jedem Falle thaten. Es wurde dann für die andere Bahn U_1 ebenso wie U berechnet, damit ergaben sich

²⁴⁾ Zweifel entstanden durch diese Beschränkung nur, wenn die Proximität in die Nähe des Aequinoctialbreitenkreises fiel. L. erhielt übrigens nur eine der Proximität benachbarte Distanz, da die kürzeste Entfernung der Projectionen nicht die Projection der kürzesten Entfernung ist.

²⁵⁾ In der von Littrow zur Erläuterung seines Verfahrens in Denkschr. XVI. gegebenen Darstellung einer solchen Zeichnung für Calliope—Psyche scheint bei der südlich von der Ekliptik gelegenen Proximität ein Versehen stattgefunden zu haben, wenn nicht die Wiedergabe der Zeichnung in verkleinertem Massstab zu einer Ungenauigkeit Veranlassung gegeben hat.

die wahren Anomalieen und die Radien-Vectoren in der Knotenlinie, deren Differenz $R - R_1$ als kürzeste Entfernung gelten konnte.

Im anderen Falle, wo die berechnete Länge l der Knotenlinie sehr von der durch die Zeichnungen gefundenen Länge der Proximität abwich, nahm L. zur Vereinfachung an, dass den beiden Endpunkten der kürzesten Distanz dieselbe (gefundene) Länge zukomme. Man fand dann ohne Schwierigkeit die Entfernung der beiden jetzt bekannten Punkte. Durch Variation von L ergaben sich verschiedene Werthe der Distanz, aus denen dann die kürzeste durch Interpolation gefunden werden konnte.

In den meisten Fällen begnügte sich Littrow damit, dort Proximitäten anzunehmen, wo die kürzesten Entfernungen der beiden Projectionen eine bestimmte Grenze nicht überschritten. Abgesehen von dieser Lizenz liefert auch die stricte Anwendung des beschriebenen Verfahrens nicht die wahre Proximität, sondern nur eine in der Nähe liegende. Dabei sind die Bedenken ausser Acht gelassen, die jede graphische Methode einflüssen muss.²⁶⁾ Gleichwohl hat sich Littrow ihrer ausschliesslich bedient; das Modell musste bei der wachsenden Zahl der Planeten fortfallen, die Zeichnungen wurden zweckmässiger als anfangs von geschickten Hilfskräften entworfen.²⁷⁾ Dass Littrow selbst nicht vollkommen befriedigt war,²⁸⁾ zeigen seine späteren Bemühungen durch Rechnung zum Ziele zu kommen, von denen er jedoch keine numerischen Anwendungen gemacht hat. Bevor wir zu dieser weiteren Methode übergehen, wollen wir uns mit dem Verfahren Linsser's beschäftigen, der an Stelle der Zeichnungen Tafeln setzte. Auch er hat

²⁶⁾ Littrow giebt als ungefähre Grenze des noch unterscheidbaren der in verhältnissmässig grossem Massstabe dargestellten Zeichnungen 0,01 an, eine Zahl, die hinreichen mochte, wenn eine Entfernung von 0,1 noch als Proximität zugelassen wurde. In der letzten Abhandlung (Denkschr. XXXI) hat L. diese Grenze der Distanz in der Proximität auf 0,05 herabgesetzt; die Längeneinheit wurde hier in den Zeichnungen durch 2 Wiener Zoll repräsentirt (= 5,3 cm).

²⁷⁾ Die Modelle wurden für 38 Planeten und periodische Cometen construirt. — Für veränderte Elemente würden die Zeichnungen eine neue Bearbeitung erfordern.

²⁸⁾ Vergl. Denkschr. XVI, pg. 50.

wirklichen Gebrauch von seinem Verfahren zur Berechnung von Proximitäten gemacht.

3. Linsser's Methode. Linsser²⁹⁾ vermied, wie erwähnt, die Ungenauigkeiten, die auf graphischem Wege entstehen, aber er ging ebenfalls von der nicht genau der Wahrheit entsprechenden Annahme aus, dass die Punkte kürzester Distanz in ein und demselben Breitenkreise liegen. Bedeuten Ω und i Knotenlänge und Neigung, a und e Halbaxe und Excentricität einer Bahn, sind ferner λ und β Länge und Breite eines ihrer Punkte auf die Ekliptik bezogen, r und v Radius-Vector und wahre Anomalie desselben, so ist

$$\operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg} i \cdot \sin (\lambda - \Omega)$$

$$r = \frac{a (1 - e^2)}{1 + e \cos v}$$

Für das Argument λ wurde eine Tafel in einem Intervall von 5 zu 5° berechnet, welche die zugehörigen Werthe von

$$\text{Arg. } \lambda: \quad r, \quad \lg r, \quad \beta$$

lieferte. Durch Vergleichung von zwei solchen Tafeln fand man diejenige heliocentrische Länge λ' , bei der die Differenz der Radien-Vectoren unter einer bestimmten Grenze lag (Linsser nahm wie Littrow $0,1$ als diese Grenze an). War dies in der Nähe der (vorher zu berechnenden)³⁰⁾ Länge der

²⁹⁾ Linsser's Methode scheint nicht separat veröffentlicht worden zu sein; in der c. Arbeit von Littrow (Denkschr. XVI, pg. 77) werden seine Resultate mit den von ihm gewonnenen verglichen. Um einen Ueberblick über den Umfang der Rechnung zu erhalten, wurde der Gang derselben hier ausgeführt. Allerdings wäre dazu eine Wiedergabe der für eine Combination erforderlichen Tafeln nicht unwesentlich. — Karl Linsser, damals in Sonneberg bei Coburg, erfreute sich, wie Littrow anführt, bei seiner Arbeit der Unterstützung von D'Arrest, der, wie oben erwähnt, sich früher bereits mit dem vorliegenden Gegenstand beschäftigt hatte.

³⁰⁾ Sind K und K_1 die Längen in der Bahn für die Knotenlinie, so findet man diese unter Beibehaltung der früheren Bezeichnungen durch

$$K = U + \Omega \quad K_1 = U_1 + \Omega_1$$

wo U und U_1 wie früher (pg. 9) berechnet werden können. Die Länge in der Ekliptik λ für die Knotenlinie folgt dann aus

$$\operatorname{tg} (\lambda - \Omega) = \operatorname{tg} (K - \Omega) \cos i$$

$$\operatorname{tg} (\lambda - \Omega_1) = \operatorname{tg} (K_1 - \Omega_1) \cos i_1$$

Die Radien in der Knotenlinie sind, wenn $V = U - \omega$, $V_1 = U_1 - \omega_1$, wo $\omega = \pi - \Omega$, $\omega_1 = \pi_1 - \Omega_1$

$$R = \frac{a (1 - e^2)}{1 \pm e \cos V}$$

$$R_1 = \frac{a_1 (1 - e_1^2)}{1 \pm e_1 \cos V_1}$$

Knotenlinie der Fall, so konnte die Differenz der Radien-Vectoren in der Schnittlinie

$$\Delta = R - R_1$$

als kürzeste Distanz gelten.

Andernfalls gab die letzte Columnne der Tafeln die Differenz $\beta - \beta_1$ und da die kürzeste Distanz in dem zu der gesuchten Länge λ_0 gehörigen Breitenkreise vorausgesetzt wurde, so fand sich für λ' :

$$\Delta^2 = r^2 + r_1^2 - 2rr_1 \cos(\beta - \beta_1)$$

oder wenn kurz $r - r_1 = d$ gesetzt wird

$$\Delta^2 = d^2 + 4rr_1 \cdot \sin^2 \frac{1}{2} (\beta - \beta_1)$$

Wurde nun 0,1 als obere Grenze für Δ angenommen, so fand sich der Maximalwerth für $\beta - \beta_1$, der für ein bestimmtes r und d noch eine Distanz von 0,1 zuließ, durch die Gleichung

$$\sin \frac{1}{2} (\beta - \beta_1) = \frac{1}{2r} \sqrt{0,01 - d^2}$$

wobei $\sqrt{rr_1}$ annähernd r gleichgesetzt ist. Diese Formel lag einer anderen Tafel zu Grunde, die den Radius-Vector r und die Differenz d als Eingänge besass. In weiteren Grenzen berechnet, konnte sie für alle Planeten benützt werden und lieferte also die Maximalwerthe von $\beta - \beta_1$. War nun der zu λ' gehörige Werth von $\beta - \beta_1$ kleiner als dieser Maximalwerth, so wurde er in die Formel für Δ substituirt und man erhielt $\Delta < 0,1$. Durch Berechnung in der Nähe liegender Δ und Interpolation des kleinsten gelangte man zur Proximität, allerdings unter der genannten Voraussetzung, dass die kürzeste Distanz ganz in demselben Breitenkreise liege.

4. Letzte Methode von Littrow. Auch Littrow selbst hat, wie bereits erwähnt, den Versuch gemacht, wenn nicht die Anwendung der Zeichnungen zu umgehen, so wenigstens die durch sie erlangte Kenntniss der ungefähren Lage der Proximität durch Rechnung zu vervollständigen. Sein Ideen-gang ist in Kürze folgender:³¹⁾

Da die kürzeste Distanz auf beiden Bahnlinien senkrecht stehen muss, so liegt sie offenbar in den Normalebene, die in den Punkten der Proximität auf jenen errichtet werden. Con-

³¹⁾ Denkschriften XVI, pg. 50.

struiert man daher in der Gegend der beiläufig bekannten Bahnnähe verschiedene Normalebenen auf der einen Ellipse, so stehen die in ihnen liegenden Distanzen von den Schnittpunkten mit der anderen Bahn bereits auf jener ersten senkrecht. Durch Variation des Ortes in der ersten Bahn erhält man verschiedene solche Distanzen, aus denen man wieder durch ein interpolirendes Verfahren auf die kleinste schliesst.

So einfach dieser Weg dem Gedanken nach erscheint, so wird er doch in praxi für häufigere Anwendungen zu langwierig. Um einen Ueberblick zu erlangen, möge die wirkliche Ausführung in ihren wesentlichen Zügen hier folgen.

Ist L die näherungsweise bekannte Länge der Proximität, Ω die des aufsteigenden Knoten, i die Neigung der Bahn, so ergibt die Gleichung

$$\operatorname{tg} u = \frac{\operatorname{tg}(L - \Omega)}{\cos i}$$

das Argument der Breite u für den der Länge L entsprechenden Ort in der Bahn und damit die wahre Anomalie

$$v = u - \omega$$

und den Radius-Vector $r = \frac{p}{1 + e \cos v}$ wo p der halbe Parameter ist.

Die Tangente der Ellipse im betrachteten Punkte hat dann unter Zugrundelegung eines rechtwinkligen Coordinatensystems mit der Ekliptik als x - y -Ebene und der Aequinoctiallinie als x -Axe folgende Richtungscosinus³²⁾

$$\cos(TX) = -\frac{k \sin \alpha}{c \sqrt{p}} \sin(v + \omega + A) + \lambda$$

³²⁾ Um diese Formeln zu erhalten, kann man von den Gleichungen für den Richtungswinkel δ der Tangente gegen den Radius-Vector ausgehen, indem man also die Bahnebene als x - y -Ebene und den Radius-Vector als x -Axe betrachtet. Die $\cos$ der Winkel mit den Coordinatenachsen sind dann:

$$\cos \delta = -\frac{k}{c} \cdot \frac{e \sin v}{\sqrt{p}}, \quad \sin \delta = -\frac{k}{c} \frac{1 + e \cos v}{\sqrt{p}}, \quad 0.$$

Nimmt man dann eine Drehung um die z -Axe um den Winkel $-(v + \omega)$ vor, so fällt die x -Axe in die Knotenlinie. Hält man diese dann fest und dreht um i und endlich noch einmal um $-\Omega$ bei festgehaltener z -Axe, so gelangt man zu den im Texte angeführten Gleichungen.

$$\begin{aligned}\cos(TY) &= - \frac{k \sin \beta}{c \sqrt{p}} \sin(v + \omega + B) + \mu \\ \cos(TZ) &= + \frac{k \sin i}{c \sqrt{p}} \cos(v + \omega) + \nu\end{aligned}$$

wo k die Constante des Sonnensystems und $c = k \sqrt{\frac{2}{r} - \frac{1}{a}}$ bekannt ist und zur Abkürzung gesetzt ist:

$$\begin{aligned}\sin \alpha \cos A &= \cos \Omega & - \frac{ke \sin \alpha \sin(\omega + A)}{c \sqrt{p}} &= \lambda \\ \sin \alpha \sin A &= \sin \Omega \cos i & - \frac{ke \sin \beta \sin(\omega + B)}{c \sqrt{p}} &= \mu \\ \sin \beta \cos B &= \sin \Omega & & \\ \sin \beta \sin B &= - \cos \Omega \cos i & + \frac{ke \sin i \cos \omega}{c \sqrt{p}} &= \nu\end{aligned}$$

Sind jetzt x', y', z' laufende Punktkoordinaten, so ist die Gleichung der Normalebene im betrachteten Punkte:

$$x' \cos(TX) + y' \cos(TY) + z' \cos(TZ) = P$$

Hier bestimmt sich $P = \frac{ker \sin v}{c \sqrt{p}}$.³³⁾ Den Durchschnitts-

punkt der Normalebene mit der anderen Bahn findet man nun nicht direkt. Man berechnet vielmehr auch in der zweiten Bahn für die Länge L und einen etwas geänderten Werth derselben den Radius-Vector r_1 und die wahre Anomalie v_1 , so dann gewisse Constanten³⁴⁾ $\alpha_1, \beta_1, A_1, B_1$. Hieraus erhält man die rechtwinkligen Coordinaten der Punkte

$$\begin{aligned}x_1 &= r_1 \sin \alpha_1 \sin(u_1 + A_1) \\ y_1 &= r_1 \sin \beta_1 \sin(u_1 + B_1) \\ z_1 &= r_1 \sin u_1 \sin i_1\end{aligned}$$

Bildet man jetzt

$$x_1 \cos(TX) + y_1 \cos(TY) + z_1 \cos(TZ) - P,$$

so müsste man 0 erhalten, wenn (x_1, y_1, z_1) der Schnittpunkt

³³⁾ Wegen $\cos(TX) = \frac{dx}{cdt}$, u. s. w. findet sich

$$P = \frac{xdx + ydy + zdz}{cdt} = \frac{rdr}{cdt}. \text{ Hier ist } \frac{dr}{dt} = \frac{ke \sin v}{\sqrt{p}}$$

einzusetzen.

³⁴⁾ Die hier eingeführten Constanten unterscheiden sich von den α, β, A, B nur dadurch, dass die Grössen mit und ohne Index vertauscht und bei $\sin \alpha_1 \sin A_1$ und $\sin \beta_1 \sin B_1$ entgegengesetzte Vorzeichen zu nehmen sind.

der vorhin construirten Normalebene wäre. Aus den übrig bleibenden Fehlern bei den beiden über L gemachten Hypothesen wird man auf den Werth von L schliessen können, für den dieser Ausdruck verschwindet.

Ich übergehe die Berechnung der Distanz D der beiden so gefundenen Punkte, die im wesentlichen ebenso bei allen Methoden wiederkehrt. Es ist dann noch nöthig, zwei nahe liegende Distanzen D' und D'' in ähnlicher Weise für die Längen L' und L'' zu rechnen, um dann aus

$$D = \Delta + f (L - A)^2$$

$$D' = \Delta + f (L' - A)^2$$

$$D'' = \Delta + f (L'' - A)^2$$

die 3 Unbekannten f , die Länge A und die Grösse Δ der Distanz in der Proximität zu berechnen.

Die Vorzüge dieser Methode liegen in der Umgehung der graphischen Hilfsmittel und der direkten Erreichung des Zieles. So lange jedoch die ganze Berechnung, insbesondere die Auffindung der Schnittpunkte der Normalebene mit der anderen Bahn nicht auf einfachere Weise gelingt, wird eine praktische Ausführung sehr umständlich bleiben.³⁵⁾ — Eine nur auf Rechnung beruhende Lösung der Aufgabe soll nun im folgenden entwickelt werden.

II.

1. Die Aufgabe, die kürzeste Entfernung zweier beliebigen Raumcurven zu finden, gehört in das Gebiet der Variationsrechnung und ist allgemein gelöst. In dem vorliegenden Falle der kürzesten Entfernung zweier Planetenbahnen ist es nicht nöthig, auf jene allgemeine Herleitung zurückzugreifen.

Wie später gezeigt werden soll, lässt sich nämlich die Entfernung Δ zweier beliebigen Punkte der Bahnen als Function zweier Veränderlichen darstellen, deren jede nur auf einen der beiden Planeten sich bezieht. Nennen wir diese

³⁵⁾ Trotz mehrfacher Versuche ist es mir nicht gelungen, im Verfolge des Gedankenganges dieser der Theorie nach ebenso anziehenden als einfachen Methode die der praktischen Durchführung entgegenstehenden Schwierigkeiten zu beseitigen.

ξ und ξ_1 , so besteht die Bedingung dafür, dass Δ ein Minimum wird, in dem Verschwinden der ersten Differentialquotienten nach den beiden unabhängigen Variablen:

$$\frac{d\Delta}{d\xi} = 0 \quad \frac{d\Delta}{d\xi_1} = 0$$

Führt man ein rechtwinkliges Coordinatensystem ein, so dass

$$\Delta^2 = (x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2 + (z_0 - z_1)^2$$

wird, wenn $(x_0 \ y_0 \ z_0)$ und $(x_1 \ y_1 \ z_1)$ die Coordinaten der Endpunkte sind, dann kann man $x \ y \ z$ als neue Variable ansehen, die von ξ und ξ_1 abhängen und hat:

$$\frac{\partial \Delta}{\partial x} \cdot \frac{dx}{d\xi} + \frac{\partial \Delta}{\partial y} \cdot \frac{dy}{d\xi} + \frac{\partial \Delta}{\partial z} \cdot \frac{dz}{d\xi} = 0$$

$$\frac{\partial \Delta}{\partial x} \cdot \frac{dx}{d\xi_1} + \frac{\partial \Delta}{\partial y} \cdot \frac{dy}{d\xi_1} + \frac{\partial \Delta}{\partial z} \cdot \frac{dz}{d\xi_1} = 0$$

als die neuen Bedingungsgleichungen des Minimi. Nun sind $\frac{\partial \Delta}{\partial x}$ u. s. w. den $\cos(\Delta, x)$ u. s. w. gleich. Anstatt von ξ und ξ_1 , welche den Ort der Endpunkte in den beiden Ellipsen bestimmen, kann man x, y, z als abhängig von den von irgend einem Punkte gezählten Ellipsenbogen s und s_1 ansehen³⁶⁾ und hat dann

$$\cos(\Delta, x) \cdot \frac{dx}{ds} + \cos(\Delta, y) \cdot \frac{dy}{ds} + \cos(\Delta, z) \cdot \frac{dz}{ds} = 0$$

$$\cos(\Delta, x) \cdot \frac{dx}{ds_1} + \cos(\Delta, y) \cdot \frac{dy}{ds_1} + \cos(\Delta, z) \cdot \frac{dz}{ds_1} = 0$$

Diese Gleichungen bedeuten nichts anderes, als dass die kürzeste Entfernung senkrecht steht zu den Tangenten in ihren beiden Endpunkten.

2. Bestimmung des Ortes der Proximität. Die wichtigste Frage, die sich zunächst darbietet, betrifft die Wahl der Veränderlichen, von denen die Entfernung abhängt. Es kamen als solche, wenn man von der Zeit ganz absieht, d. h. das

³⁶⁾ Als Variable ξ und ξ_1 werden im folgenden die excentrischen Anomalieen gewählt werden. Von der excentrischen Anomalie hängt aber bekanntlich das elliptische Integral, welches den Bogen darstellt,

$$a \int_0^{\xi} d\xi \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \xi}$$

allein ab; e ist die Excentricität.

Problem rein geometrisch betrachtet, insbesondere die wahre und die excentrische Anomalie, sowie der Radius-Vector in Betracht. Ausserdem könnte man etwa noch an den Richtungswinkel der Tangente gegen den Radius und an rechtwinklige Coordinaten denken. Das erstere giebt deshalb complicirte Resultate, weil sich zwischen den in dem Ausdruck für Δ auftretenden Grössen (dem Radius-Vector und der wahren Anomalie) und dem Richtungswinkel keine einfachen Beziehungen ergeben; den zweiten Weg schlug Grunert ein, der, wie oben (pg. 5) erwähnt, zu keinen für die wirkliche Berechnung brauchbaren Resultaten gelangte.

Unter den drei zuerst genannten Grössen hat Littrow in den von ihm aufgestellten Ausdrücken für eine strenge Lösung des Problems³⁷⁾ mit gutem Glück die excentrische Anomalie ausgewählt. Bei der Wahl dieser Variabeln, durch welche sich die Formeln bei weitem am einfachsten gestalten, liegt die Nothwendigkeit einer getrennten Behandlung elliptischer und parabolischer Bahnen vor. Dies ist der wesentliche Grund der Beschränkung der vorliegenden Untersuchung auf jene, die damit gleichzeitig die periodischen Cometen als die für die Frage der Proximitäten allein interessanten umfasst.

Um die Gleichungen in derjenigen Folge an einander zu reihen, in welcher sie bei der Berechnung in Anwendung kommen, soll zunächst die Lage der Schnittlinie der beiden Bahnen durch die Winkel U und U_1 mit den Knotenlinien und die gegenseitige Neigung J bestimmt werden.

Sind Ω, Ω_1 die Knotenlängen und i und i_1 die Neigungen der beiden Bahnen gegen die Ekliptik, so bestehen die vier Gleichungen:

$$(1) \left\{ \begin{array}{l} \sin \frac{J}{2} \cdot \sin \frac{U + U_1}{2} = \sin \frac{\Omega_1 - \Omega}{2} \cdot \sin \frac{i_1 + i}{2} \\ \sin \frac{J}{2} \cdot \cos \frac{U + U_1}{2} = \cos \frac{\Omega_1 - \Omega}{2} \cdot \sin \frac{i_1 - i}{2} \\ \cos \frac{J}{2} \cdot \sin \frac{U - U_1}{2} = \sin \frac{\Omega_1 - \Omega}{2} \cdot \cos \frac{i_1 + i}{2} \\ \cos \frac{J}{2} \cdot \cos \frac{U - U_1}{2} = \cos \frac{\Omega_1 - \Omega}{2} \cdot \cos \frac{i_1 - i}{2} \end{array} \right.$$

³⁷⁾ Sitzungsber. der Wiener Akademie XII. — s. pg. 6. (I, 1).

Nun ist das Quadrat der Entfernung zweier Punkte der beiden Bahnen, wenn ihre Radien-Vectoren r, r_1 und die wahren Anomalieen v, v_1 , die der Schnittlinie V, V_1 sind

$$\Delta^2 = r^2 + r_1^2 - 2rr_1 \cos \psi,$$

wo

$$\cos \psi = \cos(v - V) \cos(v_1 - V_1) + \sin(v - V) \sin(v_1 - V_1) \cdot \cos J$$

und

$$(2) \begin{cases} V = U - \omega \\ V_1 = U_1 - \omega_1 \end{cases}$$

ist, indem ω und ω_1 die üblichen Bezeichnungen für die Winkel zwischen den Knoten- und Apsidenlinien sind. Durch Einsetzen erhält man

$$\begin{aligned} \Delta^2 = & r^2 + r_1^2 - 2rr_1 (\cos V \cos V_1 + \sin V \sin V_1 \cos J) \cos v \cdot \cos v_1 \\ & - 2rr_1 (\cos V \sin V_1 - \sin V \cos V_1 \cos J) \cos v \cdot \sin v_1 \\ & - 2rr_1 (\cos V_1 \sin V - \sin V_1 \cos V \cos J) \cos v_1 \cdot \sin v \\ & - 2rr_1 (\sin V \sin V_1 + \cos V \cos V_1 \cos J) \sin v \cdot \sin v_1 \end{aligned}$$

Hierbei erkennt man leicht, dass der erste Klammerausdruck den $\cos$ des Winkels ε zwischen den beiden Apsiden bedeutet. Die anderen sind dann die $\cos$ der drei anderen Seiten eines sphärischen Vierecks mit Quadrantendiagonalen, die den Winkel J einschliessen, wenn ε eine derselben ist; und zwar liegen ε und η, ζ und ϑ einander gegenüber, wenn wir diese setzen:

$$(3) \begin{cases} \cos \varepsilon = \cos V \cos V_1 + \sin V \sin V_1 \cos J \\ \cos \zeta = \cos V \sin V_1 - \sin V \cos V_1 \cos J \\ \cos \vartheta = \cos V_1 \sin V - \sin V_1 \cos V \cos J \\ \cos \eta = \sin V \sin V_1 + \cos V \cos V_1 \cos J \end{cases}$$

Ersetzen wir jetzt die r, r_1 und v, v_1 unter Berücksichtigung der Relationen

$$\begin{aligned} r &= a (1 - \sin \varphi \cos E) \\ r_1 &= a_1 (1 - \sin \varphi_1 \cos E_1) \\ r \sin v &= a \cos \varphi \sin E \\ r_1 \sin v_1 &= a_1 \cos \varphi_1 \sin E_1 \\ r \cos v &= a (\cos E - \sin \varphi) \\ r_1 \cos v_1 &= a_1 (\cos E_1 - \sin \varphi_1) \end{aligned}$$

durch die excentrischen Anomalieen (φ, φ_1 bedeuten die Excentricitätswinkel, a, a_1 die halben Axen), so wird

$$\begin{aligned} \Delta^2 = & a^2 (1 - \sin \varphi \cos E)^2 + a_1^2 (1 - \sin \varphi_1 \cos E_1)^2 \\ & - 2aa_1 \cos \varepsilon (\cos E - \sin \varphi) (\cos E_1 - \sin \varphi_1) \\ & - 2aa_1 \cos \zeta (\cos E - \sin \varphi) \cdot \cos \varphi_1 \cdot \sin E_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - 2aa_1 \cos \vartheta (\cos E_1 - \sin \varphi_1) \cdot \cos \varphi \cdot \sin E \\
& - 2aa_1 \cos \eta \cdot \cos \varphi \cdot \cos \varphi_1 \cdot \sin E \cdot \sin E_1
\end{aligned}$$

Hier treten nur noch E und E_1 als Variable auf. Die nach ihnen genommenen Differentialquotienten liefern gleich Null gesetzt die der kürzesten Distanz entsprechenden Werthe E^0 und E_1^0 . Durch Differentiation nach E ergibt sich:

$$\begin{aligned}
& 2a^2 (1 - \sin \varphi \cos E) \cdot \sin \varphi \cdot \sin E \\
& + 2aa_1 \left\{ \cos \varepsilon (\cos E_1 - \sin \varphi_1) \sin E \right. \\
(\alpha) \quad & \quad + \cos \zeta \cos \varphi_1 \sin E_1 \sin E \\
& \quad - \cos \vartheta \cos \varphi (\cos E_1 - \sin \varphi_1) \cos E \\
& \quad \left. - \cos \eta \cdot \cos \varphi \cdot \cos \varphi_1 \cdot \sin E_1 \cdot \cos E \right\} = 0
\end{aligned}$$

Ganz analog erhält man durch Differentiation nach E_1 eine zweite Gleichung, in der die mit und ohne Index versehenen Grössen vertauscht sind, also auch $\cos \vartheta$ und $\cos \zeta$ in einander übergehen, dagegen $\cos \varepsilon$ und $\cos \eta$ unverändert bleiben:

$$\begin{aligned}
& 2a_1^2 (1 - \sin \varphi_1 \cos E_1) \sin \varphi_1 \sin E_1 \\
& + 2aa_1 \left\{ \cos \varepsilon (\cos E - \sin \varphi) \sin E_1 \right. \\
(\beta) \quad & \quad + \cos \vartheta \cos \varphi \sin E_1 \sin E \\
& \quad - \cos \zeta \cos \varphi_1 (\cos E - \sin \varphi) \cos E_1 \\
& \quad \left. - \cos \eta \cos \varphi \cos \varphi_1 \sin E \cos E_1 \right\} = 0
\end{aligned}$$

Eine direkte Bestimmung von E und E_1 aus diesen beiden Gleichungen (α) und (β) bleibt ausgeschlossen. In Folge dessen ist eine successive Auflösung nöthig. Eine solche wäre in doppelter Weise möglich, entweder kann man die erste Gleichung (α) nach E_1 auflösen und den erhaltenen Werth in die zweite einsetzen, die dann den ursprünglichen Werth von E liefern muss, wenn man sich in der Proximität befindet (dies wird man durch allmähliche Annäherung erreichen können) oder umgekehrt erst E , dann E_1 berechnen. In geometrische Form gekleidet würde sich dies so aussprechen lassen:

1. Entweder errichtet man in einem Punkte E der ersten Bahn eine Normalebene und erhält den Schnittpunkt E_1 derselben mit der anderen Bahn; hier errichtet man wiederum die Normalebene, dann muss im Falle der Proximität ihr Schnittpunkt E' mit der ersten Bahn mit E zusammenfallen, oder aber

2. Man legt durch einen Punkt E in I die Normalebene an die Bahn II, die hier in E_1 schneidet, von E_1 fällt man

wiederum eine Normale auf I, die in E' ihren Fusspunkt haben möge (d. h. eine Gerade, die auf der Tangente in E' senkrecht steht). Für die Bahnnähe fallen E und E' zusammen.

Die erste dieser Auflösungen ist ohne weiteres ausführbar. Führt man zunächst durch folgende Gleichungen 12 Constante ein:

$$\begin{array}{rcl|lcl}
 + \cos \vartheta \cos \varphi \sin \varphi_1 & = \alpha \sin A & + \cos \zeta \cos \varphi_1 \sin \varphi & = \alpha' \sin A' \\
 - \frac{a}{a_1} \sin \varphi + \cos \varepsilon \sin \varphi_1 & = \alpha \cos A & - \frac{a_1}{a} \sin \varphi_1 + \cos \varepsilon \sin \varphi & = \alpha' \cos A' \\
 + \cos \vartheta \cdot \cos \varphi & = \beta \sin B & + \cos \zeta \cdot \cos \varphi_1 & = \beta' \sin B' \\
 + \cos \varepsilon & = \beta \cos B & + \cos \varepsilon & = \beta' \cos B' \\
 - \cos \eta \cos \varphi \cos \varphi_1 & = \gamma \sin \Gamma & - \cos \eta \cos \varphi_1 \cos \varphi & = \gamma' \sin \Gamma' \\
 - \cos \zeta \cdot \cos \varphi_1 & = \gamma \cos \Gamma & - \cos \vartheta \cdot \cos \varphi & = \gamma' \cos \Gamma'
 \end{array}$$

wobei also

$$\beta \cos B = \beta' \cos B' \quad \gamma \sin \Gamma = \gamma' \sin \Gamma'$$

ist, und bedient man sich noch folgender Hilfsgrössen, welche die jedesmal bekannte der beiden Grössen E und E_1 enthalten:

$$\begin{array}{ll}
 \beta \sin (B + E) = \lambda \sin A & \beta' \sin (B' + E_1) = \lambda' \sin A' \\
 \gamma \sin (\Gamma + E) = \lambda \cos A & \gamma' \sin (\Gamma' + E_1) = \lambda' \cos A'
 \end{array}$$

so erhält man die beiden Gleichungen

$$\left\{ \begin{array}{l}
 \lambda \sin (E_1 + A) = \frac{a}{2a_1} \sin^2 \varphi \sin 2E + \alpha \sin (E + A) \\
 \lambda' \sin (E + A') = \frac{a_1}{2a} \sin^2 \varphi_1 \sin 2E_1 + \alpha' \sin (E_1 + A')
 \end{array} \right.$$

Aus der ersten Gleichung findet man sofort E_1 für ein gegebenes E , für dieses aus der zweiten einen Werth E' für E . Durch ein Näherungsverfahren würde man schliesslich einen Werth E erhalten, dem E' gleich wäre.

Bei der zweiten Art der Auflösung gelingt es nicht, die Unbekannte auf eine Seite allein zu bringen, doch kann man sich, wie wir sehen werden, mit der Einsetzung eines Näherungswerthes begnügen. Dieser andere Weg ist wegen der grösseren Einfachheit der Hilfsgrössen entschieden vorzuziehen.

Wenn wir die ursprünglich aufgestellten Gleichungen (α) und (β) (auf pag. 19) wiederum mit $2aa_1$ dividiren, so erhalten wir

$$0 = \frac{a}{a_1} (1 - \sin \varphi \cos E) \sin \varphi \sin E \\ + [\cos \varepsilon (\cos E_1 - \sin \varphi_1) + \cos \zeta \cos \varphi_1 \sin E_1] \sin E \\ - [\cos \vartheta (\cos E_1 - \sin \varphi_1) + \cos \eta \cos \varphi_1 \sin E_1] \cos \varphi \cos E$$

und eine analoge Gleichung [aus (β)].

Das erste Glied unterscheidet sich von

$$\frac{a}{a_1} \sin \varphi \cdot \sin E \text{ nur um } \frac{a}{2a_1} \sin^2 \varphi \cdot \sin 2E,$$

einen Ausdruck, der selbst für grosse Excentricitäten klein genug ist,^{3s)} um für E einen Näherungswerth setzen zu können, so dass eine Wiederholung der Rechnung mit einem verbesserten Werthe nur ausnahmsweise nöthig ist.

Bedient man sich folgender abkürzender Bezeichnungen:

$$(4) \left\{ \begin{array}{ll} \cos \zeta = \alpha \sin A & \cos \varepsilon = \beta \sin B \\ \cos \varphi \cdot \cos \eta = \alpha \cos A & \cos \varphi \cdot \cos \vartheta = \beta \cos B \\ \text{und der analogen} & \\ \cos \vartheta = \alpha_1 \sin A_1 & \cos \varepsilon = \beta_1 \sin B_1 \\ \cos \varphi_1 \cdot \cos \eta = \alpha_1 \cos A_1 & \cos \varphi_1 \cos \zeta = \beta_1 \cos B_1 \end{array} \right.$$

so hat man mit Berücksichtigung von


$$a (1 - \sin \varphi \cdot \cos E) = r \\ a_1 (1 - \sin \varphi_1 \cdot \cos E_1) = r_1$$

die beiden Gleichungen

$$(5) \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{tg} E_1 = \cos \varphi_1 \cdot \frac{\alpha \sin (E + A) - \cos \zeta \cdot \sin \varphi}{\beta \sin (E + B) - \cos \varepsilon \cdot \sin \varphi + \frac{r_1 \sin \varphi_1}{a}} \\ \operatorname{tg} E = \cos \varphi \cdot \frac{\alpha_1 \sin (E_1 + A_1) - \cos \vartheta \cdot \sin \varphi_1}{\beta_1 \sin (E_1 + B_1) - \cos \varepsilon \cdot \sin \varphi_1 + \frac{r \sin \varphi}{a_1}} \end{array} \right.$$

Das Verfahren der Auflösung ist nun einfach folgendes: Für r_1 wird ein Näherungswerth eingesetzt und E_1 für ein (womöglich in der Nähe der Proximität liegendes) E berechnet; E_1 wird in die zweite Gleichung eingesetzt und ein Werth E' für E gefunden. Dann liegt, wie die Anschauung zeigt, E' der

^{3s)} Nimmt man $a = a_1$ an, so wird diese Grösse in maximo 0,0732 für (132) Aethra, welche die grösste Excentricität zu besitzen scheint. φ beträgt etwa 22°, 5, eine bei der Unsicherheit der Bahn dieses Planeten noch nicht verbürgte Zahl.



Proximität näher als E . Denn das von E (wenn dieser Buchstabe zugleich den Punkt bezeichnet) auf die andere Bahncurve gefällte Perpendikel EE_1 ist als Hypotenuse grösser als E_1E' , insofern man den kleinen Bogen EE' als geradlinig betrachten darf. Eine raschere Annäherung wird man jedoch erzielen, wenn man für mehrere um etwas auseinanderliegende Werthe von E die zugehörigen E' berechnet und daraus den Ort interpolirt, für den E und E' zusammenfallen.

Ohne die durch fortlaufende Numerirung (1--5). wie ich glaube, genügend hervorgehobenen Gleichungen nochmals zu wiederholen, möge doch einiges die Rechnung betreffendes hier zur Sprache kommen. Im allgemeinen lässt sich wohl sagen, dass eine wesentliche Abkürzung füglich nicht zu erwarten ist; einen verhältnissmässig nicht geringen Theil der Rechnung bildet allerdings die Aufsuchung der gegenseitigen Neigung der Bahnen, die Lage ihrer Schnittlinie und der Radien-Vectoren in dieser; doch wird man erstere bei jeder Art der Berechnung in Betracht ziehen müssen, wobei sich dann fast gleichzeitig die zweite ergibt. Zudem haben beide nicht den Charakter von blossen Hilfsgrössen, sondern nehmen ein eigenes Interesse in Anspruch und bedingen wesentlich eine bessere Uebersicht und Beurtheilung der gewonnenen Resultate.

Denkt man sich die beiden Bahnebenen bis an die scheinbare Himmelskugel erweitert, so werden sich die beiden entstehenden grössten Kugelkreise in zwei Punkten schneiden, von denen einer nördlich, der andere südlich von der Ekliptik liegt (oder beide gleichzeitig in der Ekliptik). Rechnet man U und U_1 , die man aus den Gleichungen (1) (pag. 17) findet, von den aufsteigenden Knoten im Sinne der täglichen Bewegung, so erhält man für $\Omega_1 - \Omega < 180^\circ$ den nördlichen, für $\Omega_1 - \Omega > 180^\circ$ den südlichen Schnittpunkt. Will man daher im zweiten Falle die U , U_1 und V , V_1 erhalten, welche auf den nördlich von der Ekliptik gelegenen Theil der Schnittlinie beider Bahnen sich beziehen, so muss man die erhaltenen Winkel um 180° verändern. Ausser der bekannten Prüfung

der Gauss'schen Gleichungen kommen noch einige Regeln zur Controle der Rechnung in Betracht:³⁹⁾

(1) Für negatives $i_1 - i$ ist

$$540^\circ > U + U_1 > 180^\circ$$

für positives $i_1 - i$ liegt $U + U_1$ ausserhalb dieses Intervalles.

(2) $\frac{1}{2}(U + U_1)$ und $\frac{1}{2}(U - U_1)$ sind mit $\frac{1}{2}(\Omega_1 - \Omega)$ gleichzeitig grösser oder kleiner als 90° . Eine Ausnahme macht nur $\frac{1}{2}(U + U_1)$, im Falle $i_1 - i$ negativ ist.

(3) $i_1 + i > J > i_1 - i$.⁴⁰⁾

Hat man aus den Gleichungen (2) (pag. 18) V und V_1 gefunden, so berechnet man die Radien in der Schnittlinie durch

$$\begin{aligned} p &= a \cos^2 \varphi & p_1 &= a_1 \cos^2 \varphi_1 \\ R &= \frac{p}{1 + e \cos V} & R_1 &= \frac{p_1}{1 + e_1 \cos V_1} \end{aligned}$$

Eine sehr kurze Prüfung für diese kleine Rechnung gründet sich auf die bekannte Relation

$$\frac{1}{R} + \frac{1}{R_1} = \frac{2}{p}$$

Die in den Gleichungen (3) (pag. 18) angegebene Berechnungsweise der Constanten $\varepsilon, \zeta, \eta, \vartheta$ dürfte die bequemste und kürzeste sein, auch hier ist eine besonders bei Anwendung der Gauss'schen Logarithmen leichte Controle empfehlenswerth, die auf der Gleichung

$$\operatorname{tg}(V - V_1) = \frac{\cos \vartheta - \cos \zeta}{\cos \varepsilon + \cos \eta}$$

beruht.

Die Rechnung der Gleichungen (4) (pag. 21) wird theils dadurch controlirt, dass

$$\begin{aligned} A &\text{ nahezu} = V_1 - V \\ B &= 90 + V_1 - V \\ A_1 &= V - V_1 \\ B_1 &= 90 + V - V_1 \end{aligned}$$

sein muss, was streng nur für $\cos \varphi = 1$ und $\cos \varphi_1 = 1$ stattfindet, und sodann durch die Relation

$$\alpha^2 \cdot \beta^2 \cdot \cos^2 \varphi_1 \cdot \sin 2A \cdot \sin 2B = \alpha_1^2 \cdot \beta_1^2 \cdot \cos^2 \varphi \cdot \sin 2A_1 \cdot \sin 2B_1$$

³⁹⁾ $\Omega_1 - \Omega$ wird von 0 bis 360° durchgezählt, $i_1 - i$ dagegen ist positiv oder negativ $< 180^\circ$ zu nehmen, wenn die folgenden Regeln in Bezug auf die Quadranten Geltung haben sollen.

⁴⁰⁾ $\frac{1}{2}(U - U_1)$ stimmt auch der Grösse nach mit $\frac{1}{2}(\Omega_1 - \Omega)$ nahe überein. Bei $i_1 - i$ ist der absolute Werth zu verstehen.

Im Verlaufe der Rechnung nach den Endgleichungen (5) (pag. 21) kann man sodann noch darauf achten, dass E_1 nahe $= E + A$ und ebenso E nahe $= E_1 + A_1$ wird.

Hierbei sind specielle Fälle, die hin und wieder die Rechnung erleichtern können, nicht in Betracht gezogen. Nur der eine sei erwähnt, wo die Neigung der Bahnen gegen einander (für die angewandte Zahl der Decimalstellen) verschwindet. Dann ist

$$\begin{aligned}\cos \varepsilon &= \cos \eta = \cos (V - V_1) \\ - \cos \zeta &= \cos \vartheta = \sin (V - V_1)\end{aligned}$$

und mithin

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} E_1 &= \cos \varphi_1 \cdot \frac{\alpha \cdot \sin (E + A) + \sin \varphi \cdot \sin (V - V_1)}{\beta \cdot \sin (E + B) - \cos (V - V_1) \cdot \sin \varphi + \frac{r_1}{a} \cdot \sin \varphi_1} \\ \operatorname{tg} E &= \cos \varphi \cdot \frac{\alpha_1 \sin (E_1 + A_1) - \sin \varphi_1 \cdot \sin (V - V_1)}{\beta_1 \sin (E_1 + B_1) - \cos (V - V_1) \cdot \sin \varphi_1 + \frac{r}{a_1} \cdot \sin \varphi}\end{aligned}$$

Da sich die Proximität häufig in der Nähe der Knotenlinie befindet, erwies es sich in der Regel vortheilhaft, von dieser auszugehen. Aus den oben für diese berechneten V und V_1 (pag. 18, Gleichungen (2)) ergaben sich die zugehörigen excentrischen Anomalieen durch die bekannten Formeln

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} \frac{1}{2} E &= \sqrt{\frac{1 - e}{1 + e}} \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} v \\ \operatorname{tg} \frac{1}{2} E_1 &= \sqrt{\frac{1 - e_1}{1 + e_1}} \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} v_1\end{aligned}$$

in welchen, weil $\sin \varphi$ und $\cos \varphi$ besonders gebraucht werden, bei Anwendung Gauss'scher Logarithmen mit Vorthail

$$\sqrt{\frac{1 - e}{1 + e}} = \frac{\cos \varphi}{1 + \sin \varphi} \quad \sqrt{\frac{1 - e_1}{1 + e_1}} = \frac{\cos \varphi_1}{1 + \sin \varphi_1}$$

geschrieben wird. Es wurden nun noch für zwei Werthe von E , die um 5° nach beiden Seiten von der Knotenlinie ablagen, nach (5) (auf pag. 21) die zugehörigen E_1 und zu diesen die E' berechnet.⁴¹⁾ Aus den Differenzen $E' - E$, die sich er-

⁴¹⁾ Bei Planeten wie Fides und Maja, deren Proximität weit von der Knotenlinie abliegt, war es nöthig, für viel grössere Intervalle (10 oder 20°) von E die Differenzen $E' - E$ zu berechnen.

gaben,⁴²⁾ wurde dasjenige E und E_1 , für welches $E' - E$ verschwand, interpolirt, d. h. der wahre Ort der Proximität.

Bezeichnet man die in den Nennern von (5) auftretenden Ausdrücke kurz mit

$$S = -\cos \varepsilon \cdot \sin \varphi + \frac{R_1}{a} \cdot \sin \varphi_1$$

$$S_1 = -\cos \varepsilon \cdot \sin \varphi_1 + \frac{R}{a_1} \cdot \sin \varphi$$

worin R_1 und R die Radien in der Knotenlinie⁴³⁾ an Stelle der noch unbekannten r_1 und r gesetzt werden konnten, so war eine mehrmalige Berechnung dieser Grössen selten nöthig; man erhält nämlich mit meist hinreichender Genauigkeit die Aenderungen von S und S_1 durch die Differentialformeln

$$dS = \frac{a_1}{a} \cdot \sin^2 \varphi_1 \cdot \sin E_1 \cdot dE_1$$

$$dS_1 = \frac{a}{a_1} \cdot \sin^2 \varphi \cdot \sin E \cdot dE$$

Für $dE = dE_1 = 300'$ wird hierin der Factor von $\frac{a_1}{a} \sin^2 \varphi_1 \cdot \sin E_1$ resp. $\frac{a}{a_1} \sin^2 \varphi \cdot \sin E$

$$[8,94085]$$

Befindet man sich bereits in grosser Nähe der Proximität, so kann man für eine kleine Aenderung von E die von E_1 zwar nicht direct auf leichtere Weise berechnen, aber man erhält die Aenderungen des Zählers und Nenners von $\lg E$ gesondert⁴⁴⁾

$$dZ = \alpha_1 \cdot \cos (E_1 + A_1) \cdot dE_1$$

$$dN = \beta_1 \cdot \cos (E_1 + B_1) \cdot dE_1$$

⁴²⁾ Die schnellere oder langsamere Abnahme der Differenz $E' - E$ entscheidet zugleich darüber, ob die Bahnen eine kürzere oder längere Strecke einander nahe bleiben. Im letzteren Falle wird man bei wenig verschiedener mittlerer Bewegung auf eine lange Dauer der Proximität schliessen können.

⁴³⁾ R und R_1 sind aus den wahren Anomalieen V und V_1 pg. 23 bereits berechnet; zum Vergleich können sie noch aus den excentrischen Anomalieen durch die Relationen $R_1 = a_1 (1 - e_1 \cos E_1)$, $R = a (1 - e \cos E)$ abgeleitet werden.

⁴⁴⁾ dE und dE_1 durften bei den von mir gemachten Anwendungen den Betrag von etwa 1° nicht überschreiten.

und analog die Aenderungen des Zählers und Nenners von $\operatorname{tg} E_1$

$$dZ_1 = \alpha \cdot \cos(E + A) \cdot dE$$

$$dN_1 = \beta \cdot \cos(E + B) \cdot dE$$

3. Grösse der kürzesten Entfernung. Hat man die excentrischen Anomalieen in der Proximität gefunden, so erhält man hieraus die wahren

$$\operatorname{tg} \frac{1}{2} v = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} E \quad \operatorname{tg} \frac{1}{2} v_1 = \sqrt{\frac{1+e_1}{1-e_1}} \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} E_1$$

indem man die soeben (pag. 24) berechneten Wurzel ausdrücke benutzt. Sind dann $v - V$ und $v_1 - V_1$ ihre Unterschiede von den wahren Anomalieen der Schnitlinie, so geben die Gleichungen⁴⁵⁾

$$\cos \frac{J}{2} \cdot \sin \frac{(v - V) - (v_1 - V_1)}{2} = \sin \frac{\psi}{2} \cdot \sin \frac{d}{2}$$

$$\sin \frac{J}{2} \cdot \sin \frac{(v - V) + (v_1 - V_1)}{2} = \sin \frac{\psi}{2} \cdot \cos \frac{d}{2}$$

den $\sin \frac{\psi}{2}$, zu dem man den zugehörigen $\cos$ aufschlägt und aus

$$\Delta \cdot \sin \frac{1}{2} \delta = (r - r_1) \cdot \cos \frac{1}{2} \psi$$

$$\Delta \cdot \cos \frac{1}{2} \delta = (r + r_1) \cdot \sin \frac{1}{2} \psi$$

endlich die kürzeste Distanz Δ findet. r und r_1 sind vorher durch die Gleichungen

$$r = a(1 - e \cos E)$$

$$r_1 = a_1(1 - e_1 \cos E_1)$$

zu berechnen.

Die Bedeutung von d und δ als Differenzen von gewissen Winkeln und die von ψ (dem von den beiden Radien r und r_1 eingeschlossenen Winkel) kommen nicht in Betracht, da sie selbst nicht aufgesucht werden. Auch hat man nicht nöthig, die Vorzeichen zu beachten.

⁴⁵⁾ Bezeichnet man mit s die Summe der beiden Winkel, deren Differenz d in diesen Formeln auftritt, so hat man noch folgende beiden Gleichungen, die $\cos \frac{\psi}{2}$ geben, jedoch kaum in Anwendung kommen dürften:

$$\cos \frac{J}{2} \cos \frac{(v - V) - (v_1 - V_1)}{2} = \cos \frac{\psi}{2} \cdot \sin \frac{s}{2}$$

$$\sin \frac{J}{2} \cos \frac{(v - V) + (v_1 - V_1)}{2} = \cos \frac{\psi}{2} \cdot \cos \frac{s}{2}$$

In dem Falle, dass die excentrischen Anomalieen sich nur sehr wenig von denen der Schnittlinie unterscheiden, so dass die Differenzen $v - V$ und $v_1 - V_1$ als Differentiale betrachtet werden können, findet man diese durch⁴⁶⁾

$$dv = \frac{a \cdot \cos \varphi}{r} \cdot dE$$

$$dv_1 = \frac{a_1 \cdot \cos \varphi_1}{r_1} \cdot dE_1$$

4. Zeit der Proximität. Wie zahlreiche Bahnnähen Littrow auch fand, so bemerkte er doch, dass ein wirkliches Zusammentreffen zweier Planeten in der Proximität selten eintrat. Die später anzuführenden Beispiele gestatten keinen Schluss darüber, doch wird die Annahme einer kleineren Distanz als Grenze der noch als Proximität zu bezeichnenden Annäherungen die durch die inzwischen vermehrte Planetenzahl vergrößerte Wahrscheinlichkeit theilweise paralysiren.

Für einen bestimmten Planeten wird man leicht durch die Jahresephemeriden (im Berliner astronomischen Jahrbuch) erkennen, ob eine Zusammenkunft in der nächsten Zeit in Aussicht stehen dürfte.⁴⁷⁾ Ob eine so aufgefundenene Annäherung innerhalb der angenommenen Grenze liegt, wird dann die Berechnung nach dem im 2. und 3. Abschnitt (pag. 16 ff.) beschriebenen Verfahren zeigen, wobei eine wirkliche Aufsuchung der Distanz oft nicht nöthig sein wird, sondern bereits die Differenz $E' - E$ einen Anhalt geben kann. Ist dagegen für einen Planeten der Ort der Proximität berechnet, so hat Littrow⁴⁸⁾ auf folgende Weise die Zeit der Proximität berechnet. Sind t und t' die resp. Zeiten, die von irgend einem

⁴⁶⁾ Es ist

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \frac{1}{2} v &= \operatorname{tg} (45^\circ + \frac{1}{2} \varphi) \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} E \\ l \operatorname{tg} \frac{1}{2} v &= l \operatorname{tg} \frac{1}{2} E + l \operatorname{tg} (45^\circ + \frac{1}{2} \varphi) \\ \operatorname{cosec} v dv &= \operatorname{cosec} E dE \end{aligned}$$

$$dv = \frac{\sin v}{\sin E} dE$$

oder wegen $r \cdot \sin v = b \sin E = a \cos \varphi \cdot \sin E$

$$dv = \frac{a \cos \varphi}{r} dE$$

⁴⁷⁾ Vergl. pag. 31.

⁴⁸⁾ Denkschr. XVI, pg. 53 ff., XXXI, pg. 177.

bestimmten Jahre an gezählt wurden, in denen die Planeten einmal einzeln am Orte der Proximität waren, und T und T' sind ihre Umlaufszeiten, so lässt eine Vergleichung der Zahlenreihen $t + aT$ und $t' + aT'$, wenn a der Reihe nach alle ganzzahligen Werthe beigelegt werden, die geringste Zeitdifferenz der Durchgänge der beiden Planeten durch die Proximität ohne weiteres erkennen.

Nicht wesentlich verschieden von dem Verfahren Littrow's wäre das folgende: Wenn E^0 und E_1^0 die gefundenen excentrischen Anomalieen in der Proximität sind, so findet man die mittleren durch

$$M^0 = E^0 - e \sin E^0$$

$$M_1^0 = E_1^0 - e_1 \sin E_1^0$$

Sind ferner für die Epochen T und T_1 die mittleren Anomalieen M und M_1 gegeben, so liefern die Gleichungen

$$M^0 - M = \mu t'$$

$$M_1^0 - M_1 = \mu_1 t_1'$$

die Zeiten t' und t_1' , die verfließen, bis die Planeten einzeln in die Proximität kommen. Setzt man $t = t' + T$, $t_1 = t_1' + T_1$ und bezeichnet mit U und U_1 die beiden Umlaufszeiten, so hat man folgende diophantische Gleichung durch ganze Zahlen aufzulösen

$$t + xU = t_1 + yU_1$$

oder setzt man $t_1 - t = \tau$

$$xU - yU_1 = \tau$$

Wenn etwa $U < U_1$ ist und man entwickelt $\frac{U}{U_1}$ in einen Kettenbruch, dessen letzter Näherungsbruch $\frac{U^r}{U_1^r}$ ist, so erhält man bekanntlich als strenge Auflösung folgende ganze Anzahlen von Umläufen:

$$x = U_1^r \cdot \tau, \quad y = U^r \cdot \tau$$

Da es aber nur auf eine genäherte Lösung ankommt, so wird man an Stelle von $\frac{U^r}{U_1^r}$ einen früheren, z. B. den h^{ten}

Näherungswerth setzen können: $\frac{U^h}{U_1^h}$. Wird dann mit Rücksicht auf die Eigenschaft der Näherungsbrüche, nach der sie benannt sind,

$$U = k \cdot U^h, \quad U_1 = k \cdot U_1^h$$

gesetzt, wobei k auch den grössten gemeinsamen Factor von U und U_1 enthalten soll, so erhält man nach Division mit k

$$x \cdot U^h - y \cdot U_1^h = \frac{\tau}{k}$$

Die ursprüngliche Gleichung hatte nur dann eine Lösung, wenn ein gemeinschaftlicher Factor von U und U_1 auch in τ enthalten war, ebenso muss hier $\frac{\tau}{k}$ eine ganze Zahl sein. Wenn dies nicht genau der Fall ist, hat man daher an Stelle von $\frac{\tau}{k}$ die nächste ganze Zahl zu setzen. Die Auflösung giebt jetzt

$$x = \frac{\tau}{k} \cdot U^{h-1}, \quad y = \frac{\tau}{k} \cdot U_1^{h-1}$$

Auf die Zeichen, die sich von selbst ergeben, ist hierbei nicht Rücksicht genommen. Die Differenz von $t + xU$ und $t_1 + yU_1$ wird in Folge der nur angenäherten Berechnung nicht ganz verschwinden; ob die Zwischenzeit zwischen dem Eintreffen beider Planeten in der Proximität klein genug ist, um überhaupt von einer Proximität zu reden, muss jeder einzelne Fall entscheiden.

Noch einfacher als die eben behandelte lässt sich die Frage entscheiden, nach welcher Zwischenzeit eine Proximität wiederkehrt. Hat der eine Planet eine Umlaufszeit von U Tagen, der zweite von U_1 , so werden beide, wenn sie von dem Orte ausgehen, wo sie zusammenstanden, dann wieder zusammentreffen, wenn jener U_1 , dieser U Umläufe vollendet hat, und zwar zum ersten Mal, wenn U und U_1 keinen gemeinsamen Factor haben. Nun kommt es aber wiederum nicht darauf an, genau den Zeitpunkt zu finden, in welchem sie sich begegnen, sondern es genügt, die Anzahl von Umläufen für beide zu bestimmen, die sich ungefähr entsprechen. Nimmt man daher statt U_1 und U Nenner und Zähler U_1^h und U^h eines Näherungsbruches von $\frac{U}{U_1}$, wenn $U_1 > U$, so weicht das

Verhältniss $\frac{U^h}{U_1^h}$ nach einer Eigenschaft der Kettenbrüche von

$\frac{U}{U_1}$ höchstens um $\left(\frac{1}{U_1^h}\right)^2$ ab. Wenn wir also, wie üblich,

durch eckige Klammern den absoluten Werth des Ausdrucks andeuten, so ist

$$\left[\frac{U}{U_1} - \frac{U^h}{U_1^h} \right] < \left(\frac{1}{U_1^h} \right)^2$$

oder

$$\left[\frac{U \cdot U_1^h - U^h \cdot U_1}{U_1 \cdot U_1^h} \right] < \left(\frac{1}{U_1^h} \right)^2$$

mithin ist der Fehler, der dadurch entsteht, dass wir für U U^h und für U_1 U_1^h setzen

$$[U \cdot U_1^h - U^h \cdot U_1] < \frac{U_1}{U_1^h}$$

$\frac{U_1}{U_1^h}$ ist also die Anzahl Tage, um die höchstens der eine Planet von der Bahnnähe absteht, wenn der andere dieselbe passirt.

5. Dauer der Proximität. Es knüpft sich noch eine Frage von Interesse an das Vorhergehende, ob zwei Planeten längere Zeit in fast gleicher Entfernung von einander verweilen oder nicht. In der That ist Littrow in dieser Beziehung zu sehr bemerkenswerthen Resultaten gelangt.⁴⁹⁾

Berechnet man in der Nähe der zur Zeit t^0 stattfindenden kürzesten Distanz Δ eine Distanz D' , welche zur Zeit t' statt hat, so hat man mit Rücksicht darauf, dass der erste Differentialquotient für die Proximität verschwindet und mit Vernachlässigung der Glieder höherer Ordnung

$$D' = \Delta + f \cdot (t - t^0)^2$$

und damit f .

Ist dann D der noch zulässige (obere) Grenzwert der kürzesten Distanz, so liefert die Gleichung

$$D = \Delta + f \cdot (t - t^0)^2$$

zwei Werthe von t , innerhalb deren jene Entfernung nicht überschritten wird. Heissen sie t_1 und t_2 , so ist $t_2 - t_1$ die Dauer der Proximität.

⁴⁹⁾ Denkschr. XXXI, pg. 176 ff.

III.

In der Absicht, von dem angegebenen Verfahren eine Anwendung zu geben, musste ich natürlich bei 26796 Combinationen, welche die gegenwärtig bekannten 232 Planeten ergeben, von Vollständigkeit ganz abstrahiren. Andererseits bleibt vielleicht das Herausfinden solcher Planeten, die eine kleine Proximität ergeben, ein überhaupt unerreichtes Ziel. Denn auch Zeichnungen geben nur bis zu einer gewissen, wohl noch beträchtlich zu hoch liegenden Grenze mit einiger Sicherheit die Unterschiede der kürzesten Entfernungen.

Das immerhin geeignetste Mittel schien mir die Benutzung der Jahresephemeriden. Die Uebereinstimmung von Rectascension und Declination bezeichnet eine optische Annäherung, zu einer räumlichen Proximität ist auch die Uebereinstimmung der Entfernungen von Sonne und Erde erforderlich.⁵⁰⁾ Ich ging zu diesem Zweck den Jahrgang 1883 des Berliner astronomischen Jahrbuchs durch und berechnete Neigung, Lage und Grösse der Radien der Schnittlinie für die ausgewählten Planeten. Unter den 51 Planetenpaaren, die ich so erhielt, fand sich eine Anzahl, deren Distanz in der Knotenlinie unter der von D'Arrest für die Proximität angenommenen, von Littrow anfangs festgehaltenen oberen Grenze von 0,1 blieb, doch habe ich geglaubt, dass diese viel zu hoch gegriffen sei und nur die unter 0,01 (d. h. etwa der vierfachen Entfernung von Erde und Mond)⁵¹⁾ liegenden Distanzen als Proximität bezeichnen zu können geglaubt. Doch habe ich nur für die Planetenpaare die kürzeste Distanz berechnet, bei denen bereits die Radiendifferenz in der Knotenlinie unter dieser Grenze lag, indem ich von der vielleicht in einzelnen Fällen unrichtigen Voraussetzung ausging, dass so kleine Proximitäten nur in der Nähe

⁵⁰⁾ Wieviel man von der Strenge dieser Forderungen nachlassen kann, muss die Erfahrung zeigen; für die Besitzer der heliocentrischen Coordinaten (x, y, z) der Planeten dürften diese ein wohl noch geeigneteres Hilfsmittel darbieten.

⁵¹⁾ Diese Entfernung kommt im Sonnensystem beim 7. Saturntrabanten Hyperion als halbe Axe seiner Bahn vor. Eine Proximität in diesem Sinne würden noch der 1. und 4. Jupitertrabant liefern, wenn sie, vom Planeten betrachtet, in Conjunction stehen.

der Knotenlinie stattfinden können, wenigstens wenn die gegenseitige Neigung der Bahnen nicht ganz klein ist. Denn da ein wirklicher Schnitt der Bahnlinien nur in der Knotenlinie stattfinden kann, so wird allerdings eine sehr kleine Distanz in ihrer Nähe vermuthet werden dürfen. Unter den berechneten fanden sich nur zwei Paare, Doris-Chryseis und das von Littrow mir bekannte Beispiel Bellona-Thetis, welche in der Knotenlinie um weniger als 0,01 entfernte Bahnpunkte hatten, und für die daher der Ort der Proximität berechnet wurde.

Auf weitere Planeten, bei denen bedeutendere Annäherungen zu erwarten waren, wurde ich durch die bereits in der historischen Uebersicht erwähnte (pag. 4) interessante Abhandlung von Daniel Kirkwood⁵²⁾ aufmerksam. Er stellt vier Paare von Planeten (ein fünftes Sirona-Ceres hat sich durch den Umstand eingeschlichen, dass bei Sirona die Neigung irrthümlich = $11^{\circ} 35'$ statt $3^{\circ} 35'$ angegeben ist) zusammen, die eine überraschende Aehnlichkeit in den Elementen zeigen. Ich habe ihnen noch zwei hinzugefügt, bei denen allerdings die Sicherheit der Elemente noch nicht gut verbürgt ist. Es wird von Interesse sein, hier eine Zusammenstellung zu finden:⁵³⁾

	π	Ω	i	e	a
(19) Fortuna	$31^{\circ} 3'$	$211^{\circ} 27'$	$1^{\circ} 33'$	0,1594	2,4415
(79) Eurynome	44 22	206 24	4 37	0,1945	2,4436
(37) Fides	66 26	8 21	3 7	0,1758	2,6440
(66) Maja	46 21	8 17	3 5	0,1655	2,6495
(97) Klotho	65 35	160 44	11 45	0,2580	2,6679
(3) Juno	54 50	170 53	13 1	0,2579	2,6682
(122) Gerda	204 28	178 44	1 37	0,0407	3,2148
(167) Urda	32 39	170 7	1 42	0,3121	3,2186
(52) Europa	106 48	129 39	7 27	0,1106	3,0962
(159) Aemilia	101 20	135 14	6 5	0,1094	3,1075
(200) Dynamene	46 39	325 26	6 56	0,1334	2,7378
(203) Pompeja	43 24	348 38	3 13	0,0596	2,7389

⁵²⁾ l. c. (Note 14) pag. 369.

⁵³⁾ Für die ersten 3 Planetenpaare sind die Zahlenwerthe, wie sie Kirkwood anführt, beibehalten. Für die 3 andern liegen die Angaben des Berl. astr. Jahrbuchs für 1883 zu Grunde, mit denen (auch für jene ersten) die unten folgenden Rechnungen ausgeführt sind. Auf die Aehnlichkeit der Bahnen von Urda und Gerda hat bereits ihr Entdecker C. H. F. Peters in Clinton aufmerksam gemacht.

Ausser für die letzte Combination, bei der die Aehnlichkeit geringer war und die Elemente des ersten Planeten noch unsicher sind, wurden für die vorstehenden Planetenpaare die Proximitäten berechnet und die Hoffnung auf kleine Proximitäten bestätigt gefunden.

Einer Anregung meines Vaters verdanke ich sodann einer Frage näher getreten zu sein, deren eingehende und vollständige Behandlung eine besondere Untersuchung in Anspruch nehmen würde, bei der aber die Aufsuchung von Proximitäten von grosser Bedeutung ist. Die aus den Störungen verschiedener kleinen Planeten geschlossenen Werthe für die Jupitersmasse haben zu Resultaten geführt, die zum Theil von den von Bessel u. a. aus Elongationen der Jupiterstrabanten erhaltenen abweichen,⁵⁴⁾ und es lag nahe zu vermuthen, dass

⁵⁴⁾ Ueber die verschiedenen Bestimmungen der Jupitersmasse sehe man: Olbers „Ueber Herrn Professor Airy's neue Bestimmung der Jupitersmasse“ in den kleinen astr. Ephemeriden v. Harding und Wiesen f. 1834; sodann: Encke, Ueber den Cometen von Pons, 4. Abh. Berlin 1844, pag. 6, und Dr. W. Schur, Bestimmung der Masse des Planeten Jupiter in den „Nova acta der kaiserl. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher XLV Nr. 3. Halle 1882. Aus dieser Arbeit entnehme ich die folgende Uebersicht:

Aus Trabantenmessungen fand

Triesnecker das Verhältniss der Sonnen- zur Jupitersmasse

1048,55

Santini	51,09
Airy	47,81
Bessel	47,91
Jacob	47,54
Vogel	47,76
Schur	47,23

im Mittel 1048,27

Durch Kometenstörungen fand dasselbe

Möller	1047,79 (o $\leq$ Faye)
v. Asten	1050,48 (o $\leq$ Encke)
im Mittel	1049,14

Die Resultate aus den Planetenstörungen sind folgende:

Nicolai fand durch	Juno	1053,92
Encke	Vesta	50,36
Schubert	Thalia	48,23
Krüger	Themis	47,54
Hansen	Egeria	51,12
Becker	Amphitrite	47,37

im Mittel 1049,76

Sieht man von den nicht zuverlässigen Bestimmungen von Triesnecker und Santini ab, so fanden sich durch die Trabantenelongationen weit übereinstimmendere Resultate, als sie aus den Planetenstörungen erzielt wurden. Beim Encke'schen Cometen könnte ebenfalls an einen Einfluss der Asteroiden gedacht werden.

unberücksichtigte gegenseitige Störungen der Asteroiden Einfluss auf die Ergebnisse gehabt haben. Insbesondere zeigt das Resultat von Nicolai, das er aus den Störungen der Juno durch Jupiter ableitete, eine erhebliche Abweichung. Da zudem die Junobahn sich ziemlich in der Mitte des ganzen Asteroidenringes befindet,⁵⁵⁾ so konnten Annäherungen an andere Bahnen bei ihr wohl erwartet werden. Um dies zu untersuchen, habe ich die Radien in den Schnittlinien der Junobahn mit den Bahnen der ersten 200 Asteroiden, die Lage derselben und die Neigungen der Bahnen gegen die Ebene der Juno berechnet. Bei 47 Planeten blieb die Differenz der Radien in der Schnittlinie unter 0,1, unter ihnen fanden sich wiederum 8, bei denen diese Distanz kleiner als 0,01 war. Für diese wurden die Proximitäten berechnet.⁵⁶⁾

Es folgen nunmehr die Resultate der für die drei verschiedenen Klassen von Beispielen ausgeführten Rechnungen.

1.

Die folgenden Planeten sind (ausgenommen das 13. Paar) auf Grund der Jahresephemeriden des Jahrgangs 1883 des Berliner astronomischen Jahrbuchs ausgewählt, indem diese Proximitäten vermuthen liessen; in der folgenden Zusammenstellung bedeutet J die gegenseitige Neigung der Bahnen, U das dem nördlichen Theil der Schnittlinie zugehörige Argument der Breite, V die entsprechende wahre Anomalie, die also für den südlichen Schnitt beide um 180° zu ändern sind, R und R' die Radien in der Schnittlinie. Die Anordnung ist derartig, dass der früher entdeckte Planet dem anderen voransteht; die zuerst stehenden sind dann wiederum nach ihren Zahlzeichen geordnet. Die Rechnungen sind zumeist mit vierstelligen Logarithmen ausgeführt. Zu Grunde lagen denselben, wo nicht etwas anderes erwähnt ist, die Elemente aus dem Jahrbuche für 1883.

⁵⁵⁾ Ordnet man die Asteroiden nach der mittleren Entfernung von der Sonne, so nimmt Juno etwa die 100. Stelle ein.

⁵⁶⁾ Eine gegenseitige Einwirkung zweier Planeten ist besonders bei einem längeren Verweilen in kleiner Distanz zu erwarten, selbst wenn diese den hier als Maximum angenommenen Betrag überschritte.

	Zeichen	Namen der Planeten	<i>J</i>	Nördlicher Schnitt			Südl. Schnitt		
				<i>U</i>	<i>V</i>	<i>R</i>	<i>R'</i>		
1	4 37	Vesta Fides	8° 2',2	22° 45',3 117 47,7	235° 4',4 60 0,2	2,468 2,349	2,233 2,809	Die Elemente sind dem Jahrb. v. 1884 entnommen.	
2	4 63	Vesta Ausonia	11 30,0	24 19,9 149 31,5	236 39,0 217 6,2	2,463 2,620	2,237 2,148		
3	4 128	Vesta Nemesis	9 13,8	42 46,3 129 20,7	255 5,4 189 4,6	2,399 3,098	2,294 2,402		
4	4 166	Vesta Rhodope	6 25,4	54 52,4 29 10,0	267 11,5 127 52,1	2,354 2,959	2,335 2,272		
5	7 54	Iris Alexandra	9 38,0	81 13,1 27 29,3	299 37,7 46 37,0	2,028 2,297	2,550 3,014		
6	7 67	Iris Asia	5 29,0	66 21,9 123 11,5	284 46,5 19 15,4	2,134 1,987	2,406 2,837		
7	9 157	Metis Dejanira	6 29,4	168 52,3 174 49,1	166 20,0 129 56,0	2,671 2,853	2,100 2,174		
8	11 213	Parthenope Lilaea	3 24,4	129 30,1 132 4,3	296 52,7 330 25,1	2,326 2,381	2,543 3,073		
9	14 73	Irene Klytia	8 59,6	15 17,2 94 11,0	282 29,1 43 57,8	2,433 2,583	2,611 2,743		
10	15 78	Eunomia Diana	10 30,4	45 35,2 104 58,6	311 35,4 317 8,8	2,268 2,175	2,912 2,957		
11	15 141	Eunomia Lumen	4 56,2	99 57,2 75 9,0	5 57,4 20 23,9	2,150 2,126	3,134 3,178		
12	15 165	Eunomia Loreley	2 6,2	109 26,8 99 23,8	15 27,0 126 32,6	2,159 3,255	3,116 2,971		
13	17 28	Thetis Bellona	4 28,4	43 51,6 24 35,8	266 51,0 45 19,9	2,451 2,460	2,417 3,035	57)	
14	19 90	Fortuna Antiope	3 36,2	24 1,1 136 54,5	204 38,0 294 0,1	2,782 2,863	2,081 3,281		
15	20 46	Massalia Hestia	2 37,6	153 13,4 178 16,4	259 34,8 5 12,5	2,422 2,112	2,300 2,939		
16	22 134	Kalliope Sophrosyne	16 19,8	44 47,2 123 37,2	51 45,3 42 28,3	2,704 2,327	3,073 2,768		
17	24 90	Themis Antiope	1 40,5	52 3,2 16 10,2	303 37,2 146 15,8	2,875 3,552	3,318 2,685		

57) Diese Planeten sind zum Vergleich mit Littrows Resultaten gerechnet und hier gelegentlich mit angeführt. Es wurden für sie die Elemente des Jahrbuchs für 1884 benützt.

	Zeichen	Namen der Planeten	<i>J</i>	Nördlicher Schnitt			Südl. Schnitt	
				<i>U</i>	<i>V</i>	<i>R</i>	<i>R'</i>	
18	26 142	Proserpina Polana	4° 56,4	24° 34,2 138 8,2	194° 3,9 210 31,3	2,871 2,684	2,429 2,134	
19	26 152	Proserpina Atala	8 37,4	173 52,5 178 11,1	343 22,2 134 53,2	2,432 3,272	2,876 2,967	
20	27 86	Euterpe Semele	3 12,8	170 55,1 176 59,5	176 47,0 235 6,0	2,755 3,300	1,940 2,569	
21	27 179	Euterpe Klytemnästra	9 18,2	162 49,1 3 27,9	168 41,0 261 50,2	2,745 2,984	1,945 2,895	
22	35 90	Leukothea Antiope	7 56,8	163 50,0 88 19,2	317 46,6 218 24,8	2,435 3,518	3,405 2,704	
23	35 157	Leukothea Dejanira	11 33,0	106 53,0 40 53,8	260 49,6 356 0,7	2,945 2,040	2,742 3,122	
24	37 128	Fides Nemesis	5 52,0	97 43,0 29 37,0	40 13,7 89 20,9	2,258 2,702	2,957 2,709	
25	39 51	Laetitia Nemausa	0 24,8	170 12,1 169 48,1	323 53,5 171 16,1	2,506 2,524	3,006 2,206	
26	43 74	Ariadne Galatea	4 7,8	62 56,7 129 35,3	49 19,5 318 56,7	1,932 2,220	3,027 3,197	
27	43 101	Ariadne Helena	10 5,6	98 30,5 19 46,7	84 53,3 35 34,0	1,864 2,278	2,518 2,859	
28	45 64	Eugenia Angelina	7 51,2	177 8,0 14 23,6	94 27,7 200 54,8	2,887 2,992	2,548 2,364	
29	47 118	Aglaja Peitho	5 22,8	82 34,5 39 33,5	133 26,5 9 32,1	3,109 2,050	2,599 2,823	
30	48 202	Doris Chryseis	6 27,0	85 26,4 132 11,6	199 48,0 142 16,7	3,301 3,309	2,921 2,837	
31	55 61	Pandora Danae	13 9,0	124 43,5 160 43,1	123 20,8 150 23,6	2,933 3,387	2,505 2,545	
32	55 68	Pandora Leto	4 29,6	97 55,6 64 7,2	96 32,9 123 54,1	2,747 2,978	2,659 2,412	
33	60 79	Echo Eurynome	1 27,6	53 10,5 38 31,1	145 50,9 200 53,0	2,726 2,872	2,011 1,990	
34	62 153	Erato Hilda	7 54,0	138 36,9 36 12,3	225 23,3 338 45,0	3,454 3,371	2,695 4,507	
35	62 167	Erato Urda	1 32,8	129 41,5 85 22,1	216 27,9 222 50,2	3,525 3,770	2,653 2,365	
36	62 168	Erato Sibylla	4 50,8	110 54,4 26 59,2	197 40,8 223 45,6	3,634 3,548	2,592 3,204	

	Zeichen	Namen der Planeten	J	Nördlicher Schnitt			Südl. Schnitt	
				U	V	R		
37	63 128	Ausonia Nemesis	9° 58,5	136° 5,4 39 53,4	203° 40,1 99 37,3	2,663 2,765	2,119 2,649	
38	75 133	Eurydike Cyrene	4 33,4	97 59,3 136 33,7	122 24,9 210 28,3	2,891 3,408	2,077 2,676	
39	75 183	Mnemosyne Istria	22 3,4	89 45,5 143 55,7	236 13,8 241 42,1	3,319 3,708	2,918 2,646	
40	77 126	Frigga Velleda	1 5,6	75 22,4 54 16,4	18 32,3 89 37,7	2,331 2,411	2,996 2,414	
41	79 108	Eurynome Hekuba	8 37,0	163 13,0 17 38,4	325 34,9 196 33,2	2,026 3,525	2,799 2,894	
42	97 111	Klotho Ate	16 5,2	169 54,9 24 28,7	265 10,8 222 0,3	2,552 2,782	2,444 2,378	
43	104 106	Klymene Dione	2 8,2	46 53,7 27 14,7	30 53,2 64 31,3	2,705 2,847	3,553 3,319	
44	114 152	Kassandra Atala	9 17,8	50 37,8 173 27,8	62 16,1 130 9,9	2,462 3,297	2,807 2,947	
45	117 193	Lomia Ambrosia	3 20,4	174 28,0 172 54,2	115 21,0 93 17,2	3,019 2,406	2,961 2,328	
46	121 159	Hermione Aemilia	6 48,0	130 19,0 72 12,0	208 31,1 106 6,2	3,825 3,166	3,068 2,981	
47	121 171	Hermione Ophelia	2 11,0	112 34,6 88 15,0	190 46,7 45 25,5	3,884 2,869	3,030 3,382	
48	135 208	Hertha Lacrimosa	0 56,6	122 42,8 98 52,4	146 44,1 233 24,8	2,807 2,954	1,985 2,779	
49	145 146	Adeona Lucina	1 45,0	59 20,6 52 55,6	18 31,5 281 6,9	2,342 2,673	2,981 2,746	
50	167 168	Urda Sibylla	1 25,0	58 25,3 18 45,7	195 53,4 215 32,1	4,152 3,571	2,235 3,184	
51	195 196	Eurykleia Philomela	7 48,0	122 11,2 57 29,0	23 46,6 138 36,5	2,625 3,101	3,109 3,076	

Die kleinsten Distanzen (unter 0,1), welche sich in der Knotenlinie ergaben, sind folgende (N oder S bezeichnet, ob in dem nördlichen oder südlichen Theil der Schnittlinie die Annäherung stattfindet):

7	Metis — Dejanira	0,074	S
8	Parthenope — Lilaea	0,055	N

10	Eunomia — Diana	{ 0,094 N
		{ 0,045 S
11	Eunomia — Lumen	{ 0,024 N
		{ 0,044 S
14	Fortuna — Antiope	0,081 N
19	Proserpina — Atala	0,091 S
25	Laetitia — Nemausa	0,018 N
30	Doris — Chryseis	{ 0,008 N
		{ 0,084 S
31	Pandora — Danae	0,040 S
33	Echo — Eurynome	{ 0,021 S
		{ 0,046 N
36	Erato — Sibylla	0,086 N
40	Frigga — Velleda	0,080 N
41	Eurynome — Hekuba	0,095 S
42	Klotho — Ate	0,066 S
46	Hermione — Aemilia	0,087 S
51	Eurykleia — Philomela	0,033 S

Unter 0,01 lag hiernach die Differenz der Radien in der gemeinsamen Knotenlinie bei Doris — Chryseis und bei dem unter vorstehenden nicht aufgeführten Planetenpaar 13. Thetis — Bellona (vergl. Note 57). Für diese beiden Combinationen wurden (siehe pag. 31. 32) die Proximitäten berechnet. Wenn Δ die kürzeste Entfernung bedeutet, so sind folgende Daten für die Proximität gefunden:

		E	v	Δ
(17)	Thetis	23° 49,2	44° 31,6	0,0002
(28)	Bellona	273 19,8	265 53,6	
(48)	Doris	200 50,2	199 45,8	0,006
(202)	Chryseis	138 28,0	141 42,0	

2.

Für die durch die Aehnlichkeit der Elemente ausgezeichneten (und auf pag. 32 aufgeführten) Planetenbahnen schien die früher (pag. 31) gemachte Annahme, dass die Proximität in der Nähe der Knotenlinie liege, nicht mehr berechtigt.

Ausser für Dynamene-Pompeja⁵⁸⁾ wurden für diese Planeten die Proximitäten berechnet, die allerdings zum Theil die gesteckte Grenze von 0,01 überschreiten.⁵⁹⁾

Zeichen	Namen der Planeten	J	Nördlicher Schnitt			Südl. Schnitt	Proximität	
			U	V	R	R'	E	Δ
52	3 Juno 97 Klotho	2° 29,0	54° 51,2 64 37,8	170° 7,5 159 53,7	3,335 3,283	1,996 2,014	357° 23,0 349 29,3	0,0104
53	19 Fortuna 79 Eurynome	3 4,4	173 6,4 177 41,4	353 43,3 340 3,3	2,057 1,987	2,826 2,877	154 4,6 136 56,4	0,0411
54	37 Fides ⁶⁰⁾ 66 Maja	0 1,1	177 23,5 177 22,6	119 36,0 138 4,9	2,806 2,947	2,352 2,270	344 49,4 0 18,5	0,0469
55	52 Europa 159 Aemilia	1 30,7	156 59,8 151 26,8	179 50,5 185 21,0	3,439 3,445	2,754 2,769	178 9,4 184 18,0	0,0069
56	122 Gerda 167 Urda	0 16,0	106 15,6 114 51,0	80 32,0 252 19,1	3,188 3,211	3,232 2,655	79 19,8 271 44,3	0,0032
57	200 Dynamene 203 Pompeja	± 10,2	162 19,1 139 11,5	81 6,6 84 25,1	2,745 2,742	2,634 2,716	—	—

Europa und Aemilia nähern sich nochmals bedeutend (bis auf 0,0132) bei

$$E = 356^{\circ} 6,4 \quad E_1 = 1^{\circ} 2,1.$$

3.

Es folgen nunmehr die Resultate, welche sich für den Planeten Juno ergaben. Jede obere Reihe bezieht sich in der

⁵⁸⁾ Vergl. pag. 32.

⁵⁹⁾ Bisweilen ergibt sich die Distanz in der Proximität unbedeutend grösser als in der Knotenlinie, was bei der Unsicherheit der 4. Decimale ohne Bedeutung ist. Von Interesse wird es noch sein, die Differenzen der wahren Anomalien in der Proximität und in der Knotenlinie (im Sinne $P - K$) hier zu finden.

Juno	+	6° 28,9	Fides	+	42° 16,4
Klotho	+	9 16,1	Maja	+	42 17,1
Fortuna	—	15 55,5	Europa	—	1 29,5
Eurynome	—	15 57,3	Aemilia	—	1 29,8
Gerda + 1° 6,4					
Urda + 1 29,9					

⁶⁰⁾ Für Fides und Maja wurde die Rechnung fünfstellig durchgeführt. Die Proximität findet sich bei

$$E = 344^{\circ} 49' 24'' \quad E_1 = 0^{\circ} 18' 31'' \quad \Delta = 0,04694.$$

folgenden Uebersicht auf diesen, jede untere auf den in der ersten Verticalcolumnne angegebenen Planeten. Hinzugefügt sind noch die Bemerkungen „aussen“ und „innen“, welche andeuten sollen, ob die andere Planetenbahn die Junobahn ganz umschliesst oder ob sie ganz innerhalb der Junobahn liegt. Wo keine derartige Notiz steht, greifen die beiden Bahnringe ähnlich wie die Glieder einer Kette ineinander.

(Nach den Elementen aus dem Berl. astr. Jahrbuch für 1883.)

Zeichen	Namen der Planeten	J	Nördlicher Schnitt			Südl. Schnitt	
			U	V	R	R'	
1	Ceres	16° 43,6	39° 50,1 128 27,7	55° 6,4 60 1,3	3,249 2,028	2,548 2,985	
2	Pallas	21 42,4	3 4,6 1 8,8	118 20,9 51 43,4	3,219 2,274	2,040 3,069	
4	Vesta	12 8,6	32 57,0 99 20,6	148 13,3 311 39,7	3,188 2,495	2,052 2,221	
5	Astraea	8 46,0	17 17,5 46 13,3	132 43,8 52 53,8	3,020 2,230	2,129 2,804	
6	Hebe	7 46,2	87 8,6 118 11,0	202 24,9 61 31,4	3,268 2,574	2,020 2,121	
7	Iris	14 0,4	156 48,7 68 34,1	272 5,0 286 58,7	2,474 2,117	2,520 2,422	innen
8	Flora	11 18,8	27 1,2 86 48,8	142 17,5 164 12,1	3,128 2,529	2,078 1,867	innen
9	Metis	15 12,0	21 20,3 122 49,9	136 46,6 120 17,6	3,067 2,507	2,105 2,213	
10	Hygiea	15 1,6	166 35,1 51 55,9	281 51,4 100 8,9	2,372 3,041	2,635 3,165	aussen
11	Parthenope	10 19,0	18 43,8 63 53,8	34 0,1 231 16,4	3,035 2,589	2,121 2,288	
12	Victoria	12 5,6	140 55,0 76 51,4	256 11,3 10 46,7	2,658 1,828	2,353 2,831	
13	Egeria	26 30,2	30 25,9 156 22,1	145 42,2 79 23,7	3,163 2,516	2,062 2,598	
14	Irene	15 2,6	37 28,5 120 18,1	152 44,8 27 30,0	3,228 2,200	2,036 2,944	
15	Eunomia	21 45,0	152 39,3 30 34,7	267 55,6 296 34,9	2,520 3,064	2,474 2,185	

Zeichen	Namen der Planeten	<i>J</i>	Nördlicher Schnitt			Südl. Schnitt		
			<i>U</i>	<i>V</i>	<i>R</i>	<i>R'</i>		
16	Psyche	10° 11,4	5° 58,9 25 56,1	121° 15,2 162 35,2	2,877 3,302	2,205 2,528	aussen	
17	Thetis	9 54,6	23 51,4 68 50,8	139 7,7 291 50,2	3,093 2,322	2,093 2,557		
18	Melpomene	4 59,4	45 28,7 65 40,1	160 45,0 200 38,4	3,289 2,748	2,012 1,817	innen	
19	Fortuna	11 53,2	175 5,8 134 33,0	290. 22,1 315 9,9	2,293 2,086	2,740 2,773		
20	Massalia	12 28,2	178 8,5 142 27,1	293 24,8 248 48,5	2,267 2,488	2,779 2,244		
21	Lutetia	13 23,0	13 27,0 103 17,6	128 43,5 216 41,4	2,971 2,726	2,153 2,099	innen	
22	Kalliope	21 2,0	39 56,9 142 29,9	155 13,2 149 28,0	3,249 3,157	2,027 2,642		
23	Thalia	18 13,6	33 36,9 135 24,5	148 53,2 79 38,6	3,195 2,387	2,049 2,594		
24	Themis	13 36,4	2 25,0 137 28,8	117 41,3 29 2,8	2,833 2,768	2,233 3,472		
25	Phocaea	14 58,2	78 44,0 36 54,6	194 0,3 308 14,9	2,661 1,936	2,352 2,664		
26	Proserpina	15 21,4	11 13,4 135 38,0	126 29,7 305 7,7	2,943 2,509	2,168 2,775		
27	Euterpe	12 45,0	7 1,6 83 40,0	122 17,9 89 31,9	2,891 2,276	2,198 2,280		
28	Bellona	6 8,8	41 46,4 66 19,6	157 2,7 87 12,9	3,263 2,697	2,021 2,736		
29	Amphitrite	19 7,2	1 57,3 175 51,7	117 13,6 116 9,5	2,826 2,596	2,236 2,432		
30	Urania	14 38,0	174 22,0 37 8,0	289 38,3 313 38,5	2,300 2,138	2,731 2,552	innen	
31	Euphrosyne	37 15,8	29 1,0 166 4,8	144 17,3 104 25,3	3,149 3,167	2,069 2,834	aussen	
32	Pomona	10 22,2	156 0,7 106 27,1	271 17,0 133 48,2	2,482 2,726	2,512 2,429		
33	Polyhymnia	14 52,4	2 23,8 163 49,8	117 40,1 190 42,7	2,832 3,801	2,233 1,900		
34	Circe	7 50,2	170 17,1 156 25,9	285 33,4 190 18,4	2,337 2,971	2,681 2,398		

Zeichen	Namen der Planeten	J	Nördlicher Schnitt			Südl. Schnitt	
			U	V	R	R'	
35	Leukothea	21° 12,0	86° 50,2 272 0,2	202° 6,5 65 56,8	3,270 2,604	2,019 3,128	
36	Atalante	31 37,2	5 18,9 176 16,1	120 35,2 132 45,6	2,869 3,139	2,210 2,069	
37	Fides	15 59,6	4 32,0 166 49,0	179 48,3 169 19,7	2,859 2,216	2,715 2,423	innen
38	Leda	17 58,4	161 24,6 36 20,8	276 40,9 231 56,2	2,425 2,957	2,573 2,440	
39	Laetitia	3 46,2	38 52,3 51 52,5	154 8,6 205 33,9	3,241 3,041	2,030 2,482	
40	Harmonia	12 45,2	19 9,4 95 45,6	134 25,7 188 26,4	3,039 2,372	2,118 2,162	
41	Daphne	3 36,8	39 59,0 31 46,2	155 15,3 350 21,4	3,249 2,035	2,027 3,492	
42	Isis	15 4,0	34 54,9 120 7,7	150 11,2 246 37,7	3,207 2,596	2,045 2,125	
43	Ariadne	13 41,8	165 15,0 71 43,0	280 31,3 58 5,8	2,386 1,969	2,618 2,352	innen
44	Nysa	10 26,0	13 7,1 152 24,7	128 23,4 71 45,4	2,967 2,258	2,155 2,484	
45	Eugenia	7 22,8	30 1,3 31 17,9	145 17,6 309 37,6	3,159 2,575	2,064 2,853	
46	Hestia	10 49,6	177 42,3 166 57,3	292 58,6 353 53,4	2,271 2,113	2,773 2,938	
47	Aglaja	17 55,0	3 48,9 170 5,9	119 5,2 220 56,9	2,850 3,139	2,221 2,579	ausssen
48	Doris	6 53,8	166 32,9 152 28,1	281 49,2 266 49,7	2,373 3,110	2,634 3,088	ausssen
49	Pales	14 49,8	169 20,5 49 42,5	384 36,8 309 8,5	2,346 2,552	2,668 3,442	ausssen
50	Virginia	10 13,8	179 11,3 176 15,9	294 27,6 340 6,4	2,258 1,920	2,792 3,328	
51	Nemausa	3 14,0	164 5,9 159 4,1	280 22,2 160 32,1	2,387 2,515	2,617 2,212	
52	Europa	8 51,0	33 33,1 74 0,3	148 49,4 96 51,0	3,194 3,099	2,050 3,019	
53	Kalypso	8 54,2	15 14,5 41 39,7	130 30,8 92 46,3	2,992 2,532	2,142 2,482	

Zeichen	Namen der Planeten	<i>J</i>	Nördlicher Schnitt			Südl. Schnitt	
			<i>U</i>	<i>V</i>	<i>R</i>	<i>R'</i>	
54	Alexandra	23° 30,8	161 ⁰ 17,0 18 46,6	276 ⁰ 33,3 37 54,3	2,427 2,291	2,572 3,026	
55	Pandora	19 57,6	7 19,9 166 47,1	122 36,2 165 24,4	2,895 3,137	2,195 2,373	aussen
56	Melete	6 29,0	150 27,3 127 19,1	265 43,6 26 56,7	2,545 2,025	2,450 3,107	
57	Mnemosyne	7 24,0	87 38,8 59 6,8	202 55,1 206 35,1	2,021 3,464	3,263 2,815	
58	Concordia	8 6,0	5 50,0 15 8,6	121 6,3 347 18,4	2,876 2,588	2,207 2,812	
59	Elpis	4 24,2	0 13,3 0 18,7	115 29,6 162 20,4	2,805 3,012	2,250 2,408	aussen
60	Echo	9 45,8	172 20,0 151 15,8	287 36,3 243 56,2	2,318 1,970	2,705 2,805	
61	Danae	30 56,0	170 5,1 7 7,3	285 21,4 356 47,8	2,339 2,498	2,678 3,472	
62	Erato	11 33,6	7 47,3 52 30,1	123 3,6 139 16,5	2,900 3,492	2,192 2,672	aussen
63	Ausonia	18 43,0	176 3,4 8 50,2	291 19,7 76 24,9	2,285 2,293	2,752 2,431	
64	Angelina	14 3,6	176 31,3 30 25,7	291 47,6 216 56,9	2,281 2,937	2,758 2,400	
65	Cybele	9 38,4	4 16,7 16 3,1	179 33,0 273 44,4	2,856 3,366	2,218 3,414	aussen
66	Maja	15 59,8	3 24,4 165 38,4	118 40,7 126 20,7	2,845 2,859	2,224 2,326	aussen
67	Asia	8 32,8	158 7,7 126 26,1	273 24,0 22 30,0	2,460 1,993	2,536 2,824	
68	Leto	18 47,0	20 27,2 145 21,4	135 43,5 205 8,3	3,055 3,234	2,111 2,292	aussen
69	Hesperia	5 22,6	155 9,4 138 54,2	270 25,7 217 36,2	2,492 3,344	2,502 2,550	aussen
70	Panopaea	21 35,6	27 29,4 148 56,8	142 45,7 256 21,6	3,133 2,643	2,075 2,426	
71	Niobe	34 46,0	157 1,4 12 52,0	272 17,7 107 17,0	2,472 2,821	2,523 2,544	aussen
72	Feronia	10 3,0	162 48,2 126 0,2	278 4,5 25 56,4	2,411 2,014	2,589 2,505	

Zeichen	Namen der Planeten	J	Nördlicher Schnitt			Südl. Schnitt	
			U	V	R	R'	
73	Klytia	15° 19,4	2° 39,7 165 32,7	117° 56,0 115 19,5	2,835 2,709	2,231 2,614	
74	Galatea	9 38,0	169 0,1 142 0,5	284 16,4 331 21,9	2,349 2,165	2,664 3,317	
75	Eurydike	17 59,2	2 36,3 173 16,3	117 52,6 197 41,9	2,835 3,419	2,231 1,872	
76	Freia	11 34,0	173 13,5 131 55,5	288 29,8 252 48,9	2,310 3,497	2,716 3,159	ausßen
77	Frigga	15 26,8	1 49,1 170 25,7	117 5,4 113 35,6	2,825 2,768	2,237 2,491	
78	Diana	21 27,0	173 9,7 10 15,9	288 26,0 222 26,1	2,311 2,959	2,716 2,174	
79	Eurynome	9 40,6	163 37,1 127 51,1	278 53,4 290 13,0	2,402 2,217	2,599 2,537	innen
80	Sappho	9 37,2	138 16,2 91 7,4	253 32,5 314 7,5	2,328 1,934	2,691 2,560	innen
81	Terpsichore	20 50,2	4 39,4 172 22,7	119 55,7 169 38,0	2,861 3,441	2,215 2,258	ausßen
82	Alkmene	15 15,4	6 14,0 149 45,4	121 30,3 122 48,5	2,881 2,985	2,203 2,345	ausßen
83	Beatrix	17 17,0	10 8,3 152 56,3	125 24,6 125 25,2	2,930 2,538	2,176 2,298	
84	Klio	21 55,8	170 40,9 13 48,1	285 21,2 46 25,5	2,339 1,917	2,678 2,664	innen
85	Io	7 8,0	115 2,8 82 38,2	230 19,1 238 50,1	2,983 2,837	2,148 2,320	
86	Semele	13 17,2	21 8,3 103 28,3	136 24,6 161 34,8	3,063 3,725	2,107 2,450	ausßen
87	Sylvia	17 37,2	38 38,0 132 4,4	153 54,3 233 48,8	3,239 3,648	2,031 3,305	ausßen
88	Thisbe	15 22,2	160 46,6 54 24,4	276 2,9 22 40,5	2,432 2,348	2,565 3,166	
89	Julia	27 31,2	157 42,6 17 51,4	272 58,9 336 6,7	2,464 2,118	2,531 2,956	
90	Antiope	13 34,2	9 37,0 108 35,4	124 53,3 238 41,0	2,923 3,348	2,179 2,813	ausßen
91	Aegina	15 2,8	2 50,8 162 32,2	118 7,1 91 28,9	2,838 2,568	2,229 2,554	

Zeichen	Namen der Planeten	<i>J</i>	Nördlicher Schnitt			Südl. Schnitt	
			<i>U</i>	<i>V</i>	<i>R</i>	<i>R'</i>	
92	Undina	13° 0,4	45° 15,4 112 1,8	160° 31,7 245 38,9	3,287 3,298	2,013 3,029	aussen
93	Minerva	21 27,0	5 52,4 171 7,8	121 8,7 261 34,4	2,876 2,759	2,206 2,649	
94	Aurora	20 57,2	5 18,8 171 35,4	120 35,1 126 26,8	2,869 3,365	2,210 2,944	aussen
95	Arethusa	15 27,0	126 29,1 54 17,5	241 45,4 265 36,9	2,839 3,040	2,228 2,974	aussen
96	Aegle	18 16,6	164 7,1 12 50,1	279 23,4 172 29,9	2,397 3,475	2,605 2,624	aussen
97	Klotho	2 29,0	54 51,2 64 37,8	170 7,5 159 53,7	3,335 3,283	1,996 2,014	
98	Ianthe	28 34,0	2 4,0 178 29,2	117 20,3 24 3,8	2,827 2,207	2,235 3,135	
99	Dike	24 15,4	27 1,1 154 45,5	142 17,4 315 53,6	3,128 2,252	2,078 3,182	
100	Hekate	9 20,4	27 33,5 69 31,3	142 49,8 250 3,6	3,134 3,189	2,075 2,847	aussen
101	Helena	23 8,8	176 50,8 4 1,6	292 7,1 19 48,9	2,278 2,243	2,762 2,917	
102	Miriam	9 45,8	159 56,1 119 17,7	275 12,4 336 8,4	2,441 2,028	2,556 3,237	
103	Hera	9 7,0	19 42,3 53 49,5	134 58,6 229 2,5	3,046 2,830	2,116 2,553	
104	Klymene	14 57,0	9 0,5 135 52,3	124 16,8 119 51,8	2,915 3,334	2,183 2,848	aussen
105	Artemis	9 52,0	39 42,2 23 5,0	154 58,5 328 18,9	3,248 1,999	2,028 2,704	
106	Dione	15 3,6	17 15,5 124 10,9	132 31,8 161 27,5	3,017 3,691	2,129 2,621	aussen
107	Camilla	3 19,0	163 1,9 157 30,1	278 18,2 217 54,8	2,408 3,687	2,592 3,272	aussen
108	Hecuba	17 25,0	0 27,2 178 40,2	115 43,5 357 35,0	2,808 2,883	2,248 3,542	aussen
109	Felicitas	20 54,6	5 33,0 171 2,8	120 49,3 120 2,5	2,872 2,886	2,208 2,132	
110	Lydia	16 21,4	19 52,3 132 50,9	135 8,6 212 49,4	3,048 2,906	2,114 2,551	

Zeichen	Namen der Planeten	<i>J</i>	Nördlicher Schnitt			Südl. Schnitt	
			<i>U</i>	<i>V</i>	<i>R</i>	<i>R'</i>	
111	Ate	16° 54,6	168° 3,6 32 45,2	283° 19,9 230 16,8	2,358 2,749	2,653 2,402	
112	Iphigenia	15 24,0	175 35,1 22 21,1	290 51,4 8 26,5	2,289 2,126	2,746 2,739	innen
113	Amalthea	10 18,4	21 13,5 68 23,5	136 29,8 351 22,5	3,064 2,174	2,107 2,579	
114	Kassandra	8 9,6	3 42,6 9 49,0	118 58,9 21 27,3	2,850 2,319	2,222 3,017	
115	Thyra	22 58,2	160 2,0 22 33,0	275 18,3 288 36,1	2,558 2,443	2,438 2,160	innen
116	Sirona	14 25,6	13 57,3 119 44,9	129 13,6 31 31,1	2,976 2,415	2,150 3,084	
117	Lomia	27 58,8	179 26,5 0 29,1	294 42,8 301 22,1	2,256 2,774	2,794 2,279	
118	Peitho	18 27,8	21 1,4 143 26,8	136 17,7 113 25,4	3,061 2,538	2,108 2,233	
119	Althaca	8 47,0	158 54,5 126 1,7	274 10,8 317 30,4	2,544 2,729	2,451 2,420	
120	Lachesis	19 57,8	177 7,6 5 19,6	292 23,9 126 14,5	2,276 3,209	2,766 3,016	aussen
121	Hermione	15 28,8	29 34,9 122 35,7	144 51,2 300 47,8	3,155 3,200	2,066 3,638	aussen
122	Gerda	11 25,8	178, 51,6 170 49,0	294 7,9 145 5,4	2,262 3,320	2,788 3,106	aussen
123	Brunhild	18 16,4	166 9,4 28 52,6	281 25,7 267 22,2	2,377 2,671	2,629 2,641	aussen
124	Alkeste	10 16,4	174 56,7 157 8,5	290 13,0 100 42,8	2,295 2,653	2,738 2,577	
125	Liberatrix	8 23,8	0 36,9 1 43,1	115 53,2 258 20,6	2,809 2,771	2,246 2,685	
126	Velleda	15 34,6	5 52,8 153 14,0	121 9,1 188 35,3	2,864 2,695	2,213 2,183	innen
127	Johanna	20 0,0	16 3,9 154 20,7	131 20,2 66 6,3	3,003 2,671	2,137 2,821	
128	Nemesis	14 49,8	25 9,5 118 34,3	140 25,8 178 18,2	3,107 3,104	2,086 2,399	
129	Antigone	7 5,6	67 14,6 99 13,8	182 30,9 355 24,3	3,351 2,278	1,990 3,472	

Zeichen	Namen der Planeten	<i>J</i>	Nördlicher Schnitt			Südl. Schnitt	
			<i>U</i>	<i>V</i>	<i>R</i>	<i>R'</i>	
130	Electra	12° 16,4	130° 14,4 153 47,2	245° 30,7 279 15,7	2,792 2,891	2,258 3,091	ausßen
131	Vala	14 55,6	17 38,0 122 29,6	132 54,3 289 52,3	3,021 2,340	2,127 2,473	
132	Aethra	27 45,6	115 7,4 28 55,4	230 23,7 136 3,7	2,981 3,519	2,148 1,997	
133	Cyrene	19 37,8	169 22,0 19 18,0	284 38,3 93 12,6	2,345 3,021	2,669 2,974	ausßen
134	Sophrosyne	24 36,4	177 52,5 2 22,5	293 8,8 281 13,6	2,269 2,472	2,775 2,587	
135	Hertha	15 19,2	178 58,6 5 43,6	294 14,9 29 44,9	2,261 1,974	2,789 2,830	
136	Austria	4 34,0	146 16,4 131 6,6	261 32,7 1 7,5	2,594 2,092	2,407 2,480	
137	Meliboea	7 36,0	103 56,1 71 3,7	219 12,4 337 27,7	3,111 2,510	2,085 3,700	
138	Tolosa	14 42,6	11 30,8 127 0,8	126 47,1 230 27,5	2,947 2,658	2,166 2,161	innen
139	Juewa	23 54,2	5 27,9 173 30,9	120 44,2 11 18,1	2,871 2,292	2,209 3,258	
140	Siwa	11 56,4	13 57,4 77 10,6	129 13,7 243 59,9	2,978 2,877	2,150 2,377	
141	Lumen	24 1,4	164 34,7 16 48,7	299 51,0 322 3,6	2,216 2,182	2,860 3,059	
142	Polana	14 19,0	172 15,8 50 51,8	287 32,1 123 14,9	2,318 2,569	2,704 2,212	
143	Adria	24 15,4	171 51,2 9 12,8	287 7,5 120 27,3	2,322 2,695	2,699 2,347	
144	Vibilia	14 10,2	19 57,5 113 16,7	135 13,8 182 52,7	3,049 4,122	2,114 2,556	ausßen
145	Adeona	18 17,2	42 34,1 134 10,1	157 50,4 93 21,0	3,269 2,642	2,020 2,603	
146	Lucina	17 54,0	42 58,4 138 4,6	158 14,7 6 15,9	3,273 2,535	2,018 2,909	
147	Protogeneia	12 51,0	171 32,8 91 10,4	286 49,1 316 26,2	2,325 3,078	2,696 3,194	ausßen
148	Gallia	14 37,8	133 15,8 157 28,0	248 32,1 246 33,8	2,754 2,704	2,284 2,646	

Zeichen	Namen der Planeten	J	Nördlicher Schnitt			Südl. Schnitt	
			U	V	R	R'	
149	Medusa	11° 56,6	0° 58,3 11 28,7	116° 14,6 284 55,2	2,815 2,040	2,244 2,169	innen
150	Nuwa	11 23,0	173 27,8 136 38,8	288 44,1 347 10,7	2,308 2,601	2,720 3,356	aussen
151	Abundantia	17 57,8	15 45,6 147 0,2	131 1,9 18 30,5	2,999 2,502	2,139 2,679	
152	Atala	22 45,0	25 6,8 153 6,8	140 23,1 109 48,9	3,107 3,207	2,087 3,024	aussen
153	Hilda	11 0,4	142 28,6 85 34,4	257 44,9 28 7,1	2,640 3,330	2,369 4,523	aussen
154	Bertha	31 16,8	30 17,6 161 30,0	145 33,9 14 45,7	3,162 2,931	2,063 3,451	
155	Seylla	24 18,0	27 50,7 154 21,1	143 7,0 115 12,0	3,138 3,055	2,073 2,454	
156	Xanthippe	13 16,2	146 41,8 71 57,2	261 58,1 162 10,7	2,411 3,531	2,588 2,356	
157	Dejanira	20 14,8	34 56,6 141 45,8	150 12,9 96 52,7	3,207 2,532	2,045 2,407	
158	Koronis	13 24,4	175 58,1 65 31,5	291 14,4 288 43,9	2,287 2,812	2,751 2,909	aussen
159	Aemilia	8 47,4	23 41,8 58 43,6	138 58,1 92 37,8	3,091 3,086	2,094 3,055	
160	Una	16 43,0	4 17,8 165 27,4	119 34,1 118 51,9	2,856 2,803	2,218 2,639	
161	Athor	21 32,4	11 43,6 163 17,2	126 59,9 228 33,6	2,950 2,562	2,215 2,136	innen
162	Laurentia	17 45,4	15 2,5 146 56,7	130 18,8 39 25,6	2,990 2,585	2,143 3,395	
163	Erigone	8 27,2	6 23,2 17 50,8	121 39,5 84 7,0	2,883 2,262	2,202 2,336	
164	Eva	18 5,6	61 6,9 151 28,5	176 23,2 229 18,8	3,350 2,994	1,991 1,888	innen
165	Loreley	22 14,8	158 6,9 25 35,5	273 23,2 52 44,3	2,460 2,969	2,535 3,258	aussen
166	Rhodope	8 47,0	63 49,0 104 0,8	179 5,3 202 42,9	3,352 3,204	1,989 2,146	
167	Urda	11 19,2	0 4,8 0 37,0	116 21,1 138 5,1	2,816 3,784	2,243 2,357	aussen

Zeichen	Namen der Planeten	J	Nördlicher Schnitt			Südl. Schnitt	
			U	V	R	R'	
168	Sibylla	9° 54,8	163° 7,3 124 19,3	278° 23,6 321 5,7	2,407 3,191	2,593 2,563	ausßen
169	Zelia	18 31,2	1 11,7 117 11,7	116 28,0 204 55,1	2,817 2,633	2,242 2,072	innen
170	Maria	24 50,2	153 13,9 24 6,9	268 30,2 229 39,1	3,165 2,655	2,480 2,443	
171	Ophelia	12 21,4	11 16,8 80 30,2	126 33,1 38 4,7	2,945 2,841	2,168 3,421	
172	Baucis	22 44,4	171 39,2 10 49,8	286 55,5 14 5,6	2,324 2,117	2,697 2,639	innen
173	Ino	5 18,4	92 18,9 113 46,1	207 35,2 248 44,1	3,227 2,841	2,037 2,447	
174	Phaedra	24 44,2	169 13,0 11 31,8	284 29,3 86 57,9	2,347 2,777	2,667 2,821	ausßen
175	Andromache	16 19,4	7 19,2 154 10,4	122 35,5 244 34,9	2,895 3,621	2,196 2,679	ausßen
176	Idunna	13 1,0	59 47,8 30 33,8	175 4,1 210 56,0	3,348 3,612	1,991 2,719	ausßen
177	Irma	14 27,4	179 49,9 1 30,3	295 6,2 325 15,7	2,253 2,190	2,799 3,226	
178	Belisana	14 5,4	6 56,1 126 42,1	122 12,4 269 10,0	2,889 2,453	2,198 2,449	
179	Klytemnästra	14 15,2	146 52,8 65 9,8	262 9,1 323 32,1	2,587 2,701	2,413 3,219	ausßen
180	Garumna	13 45,2	177 49,1 33 31,5	293 5,4 221 58,2	2,270 3,038	2,774 2,351	
181	Eucharis	8 51,6	114 49,1 140 47,1	230 5,4 189 48,6	2,985 3,790	2,146 2,441	ausßen
182	Elsa	12 16,8	8 31,1 72 28,9	123 47,4 124 20,3	2,909 2,607	2,187 2,112	innen
183	Istria	16 6,2	131 50,0 157 30,2	246 26,3 255 25,6	2,781 2,692	2,265 2,252	innen
184	Dejopeja	14 11,6	178 46,8 13 10,2	294 3,1 180 6,4	2,262 3,421	2,787 2,958	ausßen
185	Eunike	11 24,2	144 40,3 160 44,3	259 56,6 298 49,3	2,614 2,539	2,390 2,870	
186	Celuta	25 37,6	12 20,4 167 48,6	127 36,7 215 12,0	2,957 2,634	2,160 2,055	innen

Zeichen	Namen der Planeten	J	Nördlicher Schnitt			Südl. Schnitt	
			U	V	R	R'	
187	Lamberta	22 ⁰ 49',8	14 ⁰ 32',3 162 16,5	129 ⁰ 48',6 330 57,3	2,984 2,146	2,146 3,258	
188	Menippe	14 9,8	130 26,6 60 34,0	245 42,9 352 40,5	2,791 2,212	2,259 3,426	
189	Phthia	9 6,4	162 8,0 129 44,6	277 24,3 326 16,3	2,417 2,377	2,582 2,521	innen
190	Ismene	6 58,2	174 24,1 168 6,3	239 40,4 239 51,0	2,299 4,176	2,731 3,548	ausßen
191	Kolga	2 19,0	3 33,8 14 6,0	118 50,1 157 36,6	2,847 3,104	2,223 2,667	ausßen
192	Nausikaa	19 51,6	177 25,3 4 51,9	292 41,6 337 34,3	2,273 1,839	2,769 2,922	
193	Ambrosia	24 39,2	0 16,8 179 41,2	115 33,1 100 4,2	2,805 2,491	2,250 2,254	
194	Prokne	6 10,4	144 56,9 155 49,1	260 13,2 355 31,9	2,610 1,999	2,393 3,238	
195	Eurykleia	20 2,8	6 25,8 168 28,2	121 42,1 70 3,6	2,883 2,761	2,202 2,940	
196	Philomele	15 39,8	27 44,7 124 5,5	143 1,0 205 13,0	3,136 3,104	2,074 3,073	
197	Arete	15 29,2	34 54,6 122 26,6	150 10,9 239 48,8	3,206 2,909	2,045 2,464	
198	Ampella	16 59,6	146 51,1 49 45,5	262 7,4 323 43,1	2,587 1,971	2,413 2,847	
199	Byblis	18 13,8	55 36,0 135 27,2	170 52,3 325 2,8	3,338 2,754	1,995 3,600	
200	Dynamene	7 22,0	156 22,1 131 28,7	271 37,4 50 16,2	2,474 2,477	2,515 2,941	ausßen

Die Junobahn nähert sich hiernach den Bahnen folgender 48 Planeten in der Schnittlinie ihrer Ebenen bis auf Entfernungen unter 0,1 (N und S deuten wiederum an, ob nördlich oder südlich von der Ekliptik):

19	Fortuna	0,033	S
21	Lutetia	0,054	S
22	Kalliope	0,092	N
24	Themis	0,065	N

27	Euterpe	0,082	S
31	Euphrosyne	0,018	N
32	Pomona	0,083	S
40	Harmonia	0,044	S
63	Ausonia	0,008	N
66	Maja	0,014	N
69	Hesperia	0,048	S
71	Niobe	0,021	S
72	Feronia	0,084	S
77	Frigga	0,057	N
79	Eurynome	0,062	S
81	Terpsichore	0,043	S
84	Klio	0,014	S
88	Thisbe	0,084	N
92	Undina	0,011	N
96	Aegle	0,019	S
97	Klotho	{ 0,052	N
		{ 0,018	S
100	Hekate	0,055	N
101	Helena	0,035	N
109	Felicitas	{ 0,006	N
		{ 0,076	S
112	Iphigenia	0,007	S
119	Althäa	0,031	S
121	Hermione	0,045	N
123	Brunhild	0,012	S
125	Liberatrix	0,038	N
126	Velleda	0,030	S
128	Nemesis	0,003	N
135	Hertha	0,041	S
136	Austria	0,073	S
138	Tolosa	0,005	S
141	Lumen	0,034	N
148	Gallia	0,050	N
149	Medusa	0,075	S
155	Scylla	0,083	N
159	Aemilia	0,005	N
160	Una	0,053	N
161	Athor	0,079	S

170	Maria	0,037	S
172	Baucis	0,058	S
183	Istria	0,089	N
		0,013	S
185	Eunike	0,075	N
193	Ambrosia	0,004	S
196	Philomela	0,032	N
200	Dynamene	0,003	N

Für die 8 Planetenpaare, welche Entfernungen unter 0,01 lieferten — ausser für Juno-Dynamene —, wurden die Proximitäten berechnet. Die für Juno-Klotho (pag. 39) bereits erwähnte Proximität, die etwas über der genannten Grenze liegt, wurde hier wiederholt. Jede obere Reihe bezieht sich auf Juno, die jedesmal folgende auf den angegebenen Planeten. Zum Vergleich sind die excentrischen Anomalieen sowohl für die Proximität, als für die Schnittlinie der beiden Bahnen (Knotenlinie) angeführt. Δ ist die kürzeste Distanz.

3	Juno und	<i>E</i>		Δ
		Knotenlinie	Proximität	
63	Ausonia	304 ⁰ 28,6	304 ⁰ 8,6	0,0029
		69 34,8	69 11,8	
97	Klotho	352 23,0	357 23,0	0,0104
		344 26,6	349 29,3	
109	Felicitas	107 13,8	106 59,4	0,0125
		103 39,2	103 20,9	
112	Iphigenia	96 23,2	95 47,6	0,007
		189 35,4	188 58,2	
128	Nemesis	129 57,6	129 56,5	0,003
		178 4,2	178 5,1	
138	Tolosa	317 47,6	317 47,6	0,005
		43 36,8	43 38,1	
159	Aemilia	128 11,8	125 58,8	0,0031
		86 20,0	84 34,6	
193	Ambrosia	308 11,2	308 15,4	0,0036
		295 59,2	296 5,1	

Der Zweck der vorliegenden Arbeit gestattet nicht, aus den vorstehenden, für die Lage der Junobahn zwischen den Asteroidenbahnen gefundenen Daten weitere Resultate abzu-

leiten. Bei einer Untersuchung, ob Störungen der Juno durch andere kleine Planeten angenommen werden können, würde noch auf zweierlei Rücksicht genommen werden müssen, ob an bestimmten Stellen der Junobahn Anhäufungen von mehreren Planeten stattfinden können, und ob einzelne Planeten längere Zeit in der Nähe der Juno verweilen. In beiden Fällen erscheinen Einwirkungen auch bei nicht ganz kleinen Proximitäten möglich.

Nur eine Bemerkung ergab sich ganz beiläufig für die Lage der Junobahn und möge hier noch angeführt werden, dass sie nämlich 23 Asteroidenbahnen umschliesst (darunter eine⁶¹⁾ mit grösserer mittlerer Entfernung), während 55 Bahnen (darunter zwei mit kleinerer Axe)⁶²⁾ ausserhalb derselben liegen. 122 Bahnen dagegen hängen mit ihr wie Kettenringe zusammen.

Das einfache Merkmal, welches darüber entscheidet, hat Linsser angegeben: Haben die Differenzen der Radien in der Schnittlinie der Bahnen gleiches Zeichen, so umschliessen sich diese, bei ungleichem Zeichen greifen sie ineinander (Denkschriften XVI, pag. 92).

Zur Veranschaulichung der ganzen Rechnung möge hier noch ein Beispiel in extenso folgen. Es wurde dazu gewählt: ⁶³⁾

(48) Doris — (202) Chryseis.

Die Elemente sind dem Jahrbuch für 1883 entnommen. Die Grössen ohne Index beziehen sich auf Doris, die mit dem Index auf Chryseis.

1. Berechnung der gegenseitigen Neigung J der Bahnen, der Argumente der Breite U und U_1 , der wahren Anomalieen

⁶¹⁾ (183) Istria. Nicht viel kleiner als die mittlere Entfernung von Juno ist die von (164) Eva.

⁶²⁾ (66) Maja und (144) Vibia. Die kleinsten mittleren Entfernungen unter den andern ausserhalb liegenden haben (59) Elpis und (123) Brunhilda.

⁶³⁾ Da die Bahnelemente von (202) Chryseis noch unsicher sind, ist das folgende nur als ein Rechnungsbeispiel zu betrachten.

V und V_1 , der Radien-Vectoren R und R_1 , sämmtlich für die Knotenlinie. (Vergl. (1) und (2) auf pag. 17, 18 und pag. 22, 23.)⁶⁴⁾

	Ω_1	137° 48',4	i_1	8° 48',0	φ_1	5° 34',3
	Ω	184 55,1	i	6 30,7	φ	3 43,2
$\Omega_1 - \Omega$	312	53,3	$i_1 + i$	15 18,7	$i_1 - i$	2 17,3
$\frac{1}{2}$	156	26,6		7 39,4		1 8,6
I	$\sin \frac{i_1 + i}{2}$	9,1246	III	$\sin \frac{i_1 - i}{2}$	8,2966	
	$\sin \frac{\Omega_1 - \Omega}{2}$	9,6017		$\cos \frac{\Omega_1 - \Omega}{2}$	9,9622 _n	
II	$\cos \frac{i_1 + i}{2}$	9,9961	IV	$\cos \frac{i_1 - i}{2}$	9,9999	
$\frac{1}{2}(U + U_1)$	108 49,0	I	8,7263	II	9,5978	
$\frac{1}{2}(U - U_1)$	156 37,4	III	8,2588 _n	IV	9,9621 _n	
			9,9761		9,9628	
		$\sin \frac{J}{2}$	8,7502	$\cos \frac{J}{2}$	9,9993	
J	6 27,0	$\frac{J}{2}$	3 13,5	Prüf.	9,9993	
		U	265 26,4	U_1	312 11,6	
		ω	245 38,4	ω_1	349 54,9	
		V	19 48,0	V_1	322 16,7	
		$\cos V$	9,9735	$\cos V_1$	9,8982	
		$\sin \varphi$	8,8121	$\sin \varphi_1$	8,9872	
		$\sin \varphi \cdot \cos V$	0,0610	$\sin \varphi_1 \cdot \cos V_1$	0,0768	
		$\cos \varphi$	9,9991	$\cos \varphi_1$	9,9979	
		$\cos^2 \varphi$	9,9982	$\cos^2 \varphi_1$	9,9958	
		a	0,4931	a_1	0,4892	
		$1 + e \cos V$	0,0257	$1 + e_1 \cos V_1$	0,0321	
		p	0,4913	p_1	0,4850	
		$1 - e \cos V$	9,9727	$1 - e_1 \cos V_1$	9,9653	
		$\lg R$	0,4656	$\lg R_1$	0,4529	
		$\lg R'$	0,5186	$\lg R'_1$	0,5197	

⁶⁴⁾ Bei einer Combination eines Planeten mit einer grösseren Anzahl anderer, wie dies bei Juno der Fall war, erscheint eine etwas modificirte Anlage der Rechnung empfehlenswerth. Die auf Juno bezüglichen Grössen

2. Berechnung der Constanten $\cos \varepsilon$, $\cos \zeta$, $\cos \vartheta$, $\cos \eta$, sowie S und S_1 und Verwandlung der wahren in excentrische Anomalieen. (Gleichungen (3) pag. 18 vergl. pag. 23, 24, 25.) Berechnung der α , β , α_1 , β_1 , A , B , A_1 , B_1 aus (4) (pag. 21).⁶⁵⁾

$(V) 199^{\circ} 48',0$	$\frac{1}{2} V 99^{\circ} 54',0$	$\frac{1}{2} V_1 71^{\circ} 8',4$
$(V_1) 142 16,7$	$(\cos \varphi) 9,9991$	$(\cos \varphi_1) 9,9979$
$(\cos V) 9,9735_n$	$1 + \sin \varphi 0,0273$	$1 + \sin \varphi_1 0,0403$
$(\cos V_1) 9,8982_n$	$\frac{1-e}{1+e} 9,9718$	$\frac{1-e_1}{1+e_1} 9,9576$
$\sin V 9,5299$	$\operatorname{tg} \frac{1}{2} V 0,7581_n$	$\operatorname{tg} \frac{1}{2} V_1 0,4664$
$\sin V_1 9,7866$	$\frac{1}{2} E 100 33,0$	$\frac{1}{2} E_1 69 21,5$
$\cos J 9,9972$	$(\lg R) 0,5186$	$(\lg R_1) 0,5197$
I $\cos V \cdot \cos V_1 9,8717$	$(\sin \varphi) 8,8121$	$(\sin \varphi_1) 8,9872$
II $\sin V \cdot \cos V_1 9,4281$	$9,3307$	$9,5069$
III $\cos V \cdot \sin V_1 9,7601_n$	$(\alpha_1) 0,4892$	$(\alpha) 0,4931$
IV $\sin V \cdot \sin V_1 9,3165_n$	$8,8415$	$9,0138$
+ I + 0,7442	$\frac{R_1}{a} \sin \varphi_1 + 0,1032$	$\frac{R}{a_1} \sin \varphi + 0,0694$
+ IV $\cos J - 0,2059$	$-\cos \varepsilon \cdot \sin \varphi - 0,0349$	$-\cos \varepsilon \sin \varphi_1 - 0,0523$
+ III - 0,5756	$S + 0,0683$	$S_1 + 0,0171$
- II $\cos J - 0,2662$	$dS + 0,0005$	$dS_1 - 0,0001$
+ II + 0,2680	$(\cos \zeta) 9,9252_n$	$(\cos \varepsilon) 9,7310$
- III $\cos J + 0,5719$	$\cos \varphi \cos \eta 9,7252$	$\cos \varphi \cos \vartheta 9,9233$
+ IV - 0,2072	$A 302 15,0$	$B 32 42,6$
+ I $\cos J + 0,7395$	$\cos A 9,9272$	$\cos B 9,9250$
$\cos \varepsilon 9,7310$	$\alpha 9,9980$	$\beta 9,9983$
$\cos \zeta 9,9252_n$	$(\cos \vartheta) 9,9242$	$(\cos \varepsilon) 9,7310$
$\cos \vartheta 9,9242$	$\cos \varphi_1 \cdot \cos \eta 9,7240$	$\cos \varphi_1 \cos \zeta 9,9231$
$\cos \eta 9,7261$	$A_1 57 45,7$	$B_1 147 16,7$
$\cos \vartheta - \cos \zeta 0,2257$	$\cos A_1 9,9273$	$\cos B_1 9,9250$
$\cos \varepsilon + \cos \eta 0,0206$	$\alpha_1 9,9969$	$\beta_1 9,9981$
Prüfung: $V - V_1 57^{\circ} 31',3$		

wurden auf ein besonderes Blatt geschrieben, soweit sie für alle Combinationen dieselben waren.

⁶⁵⁾ Die in Klammern geschlossenen Grössen sind der vorhergehenden Rechnung unmittelbar entnommen.

dS und dS_1 sind durch folgende kleine Rechnung gefunden, der die Formeln auf pag. 25 zu Grunde liegen. Es wurde $dE = dE_1 = 5^\circ$ angenommen. Es ist ferner nach dem obigen $E = 201^\circ 6,0$ $E_1 = 138^\circ 43,0$

$$\begin{array}{rcl} \frac{a_1}{a} & 9,9961 & \frac{a}{a_1} 0,0039 \\ \sin^2 \varphi_1 & \frac{7,9744}{6,9113} & \sin^2 \varphi \frac{7,6242}{6,5689} \\ \sin E_1 & 9,8193 & \sin E \frac{9,5563_n}{6,1252_n} \\ dS & 6,7306 & dS_1 \end{array}$$

3. Auflösung der Gleichungen (5) (pag. 21) durch Interpolation aus drei Versuchen.

Für E wird einmal sein Werth in der Knotenlinie und 2 um je 5° von diesem abliegende Werthe angenommen.

E	$196^\circ 6,0$	$201^\circ 6,0$	$206^\circ 6,0$	E_1	$133^\circ 43,6$	$138^\circ 43,5$	$143^\circ 46,3$
$E + B$	$228 \ 48,6$	$233 \ 48,6$	$238 \ 48,6$	$(E_1 + B_1)$	$281 \ 0,3$	$286 \ 0,2$	$291 \ 3,0$
$\sin(E+B)$	$9,8765_n$	$9,9069_n$	$9,9322_n$	$\sin(E_1+B_1)$	$9,9919_n$	$9,9828_n$	$9,9700_n$
$\beta \sin(E+B) - 0,7495 - 0,8038 - 0,8522$				$\beta_1 \sin(E_1+B_1) - 0,9772 - 0,9570 - 0,9292$			
$S + 0,0678 + 0,0683 + 0,0688$				$S_1 + 0,0172 + 0,0171 + 0,0170$			
Nenner	$-0,6817 - 0,7355 - 0,7834$			Nenner	$-0,9600 - 0,9399 - 0,9122$		
$E + A$	$138 \ 21,0$	$143 \ 21,0$	$148 \ 21,0$	$E_1 + A_1$	$191 \ 29,3$	$196 \ 29,2$	$201 \ 32,0$
$\sin(E+A)$	$9,8226$	$9,7759$	$9,7199$	$\sin(E_1+A_1)$	$9,2993_n$	$9,4530_n$	$9,5647_n$
$\alpha \sin(E+A)$	$9,8206$	$9,7739$	$9,7179$	$\alpha_1 \sin(E_1+A_1)$	$9,2962_n$	$9,4499_n$	$9,5616_n$
$-\cos \xi \sin \varphi$	$8,7373$	$8,7373$	$8,7373$	$-\cos \xi_1 \sin \varphi_1$	$8,9114_n$	$8,9114_n$	$8,9114_n$
$G. L.$	$1,1177$	$1,0748$	$1,0237$	$G. L.$	$0,5347$	$0,6489$	$0,7379$
Summe	$9,8550$	$9,8121$	$9,7610$	Summe	$9,4461_n$	$9,5603_n$	$9,6493_n$
$\lg Z_1$	$9,8529$	$9,8100$	$9,7589$	$\lg Z$	$9,4452_n$	$9,5594_n$	$9,6484_n$
$\lg N_1$	$9,8336_n$	$9,8666_n$	$9,8940_n$	$\lg N$	$9,9823_n$	$9,9731_n$	$9,9601_n$
E_1	$133 \ 43,6$	$138 \ 43,5$	$143 \ 46,3$	E'	$196 \ 11,5$	$201 \ 5,7$	$205 \ 58,4$

Für die drei verschiedenen Annahmen für E ergeben sich demnach folgende Differenzen $E' - E$: $+ 5,5$ $- 0,3$ und $- 7,6$. Interpolirt man den Werth von E , für welchen $E' - E$ verschwindet, so erhält man

$$E = 200^\circ 50,2 \quad E_1 = 138^\circ 28,0$$

4. Hieraus findet man die Grösse der kürzesten Distanz nach pag. 26, 27. Bei der geringen Entfernung der Proximität von der Knotenlinie könnte man dieselbe ohne weiteres der Differenz der Radien gleichsetzen; nur um ein auch für andere Fälle geltendes Paradigma zu haben, wird hiervon im folgenden abgesehen.

$\cos E$ 9,9706 _n	$\cos E_1$ 9,8743 _n	$\frac{1}{2} E$ 100° 25',1	$\frac{1}{2} E_1$ 69° 14',0
$e \cos E$ 8,7827 _n	$e_1 \cos E_1$ 8,8615 _n	$\operatorname{tg} \frac{1}{2} E$ 0,7355 _n	$\operatorname{tg} \frac{1}{2} E_1$ 0,4211
(a) 0,4931	(a_1) 0,4892	$\sqrt{\frac{1+e}{1-e}}$ 0,0282	$\sqrt{\frac{1+e_1}{1-e_1}}$ 0,0424
$1-e \cos E$ 0,0256	$1-e_1 \cos E_1$ 0,0305	$\frac{1}{2} v$ 99 46,6	$\frac{1}{2} v_1$ 71 1,2
$\lg r$ 0,5187	$\lg r_1$ 0,5197	v 199 33,2	v_1 142 2,4
r 3,302	r_1 3,309	V 199 48,0	V_1 142 16,7
		$V-v$ 14',8	V_1-v_1 14',3
		$\frac{1}{2}$ (Summe) 14',6	
		$\frac{1}{2}$ (Differenz) 0,2	
$\sin \frac{(V-v) - (V_1-v_1)}{2}$ 5,7648			
$(\cos \frac{J}{2})$ 9,9993			
$(\sin \frac{J}{2})$ 8,7502			
$\sin \frac{(V-v) + (V_1-v_1)}{2}$ 7,6281			
5,7641			
6,3783			
9,9875			
$\sin \frac{\psi}{2}$ 6,3908			
$r_1 + r$ 0,8203			
$r_1 - r$ 7,8451			
$\cos \frac{\psi}{2}$ 0,0000			
7,2111			
7,8451			
9,9886			
$\lg \Delta$ 7,8565			
Δ 0,00719			

5. Zeit der Proximität. (Vergl. pag. 27.)

Zunächst berechnet man die mittleren Anomalieen in der Proximität.

E^0	200° 50,2	E_1^0	138° 28,0
$\sin E^0$	9,5511 _n	$\sin E_1^0$	9,8216
$\sin \varphi$ (in Min)	2,3484	$\sin \varphi_1$	2,5235
$\sin \varphi \sin E^0$	— 1° 19,3	$\sin \varphi_1 \sin E_1^0$	+ 3° 41,4
M^0	202 9,5	M_1^0	134 46,6

Nun war nach dem Berl. astron. Jahrbuch für 1883 die mittlere Anomalie für

Doris	1880 Dec. 4,0	M	=	2° 52,7
Chryseis	1879 Dec. 7,5	M_1	=	249 29,5

Hieraus hat man

$$M - M^0 = 160^\circ 43,2 \quad M_1 - M_1^0 = 114^\circ 42,9$$

In Sekunden ausgedrückt liefern diese Zahlen folgende Logarithmen

$$5,76237 \qquad 5,61592$$

Nun ist

$$\lg \mu \ 2,81031 \qquad \lg \mu_1 \ 2,81625$$

Folglich befanden sich die Planeten

$$895,^d5 \qquad 630,^d47$$

vor den angegebenen Zeitmomenten einzeln am Orte der Proximität, nämlich

Doris 1878 Juni 24,5 Chryseis 1878 März 17,0
also zu 2 um 99,^d5 auseinander liegenden Zeiten.

Berechnet man noch die Umlaufzeiten U und U_1

$$\lg 2\pi \text{ (in Sekunden)} \ 6,11261$$

$$\bullet \qquad \lg \mu \ 2,81031$$

$$\lg \mu_1 \ 2,81625$$

$$U \ 2005,^d9$$

$$U_1 \ 1978,6$$

so hat man die folgende unbestimmte Gleichung aufzulösen

$$2005,9 \cdot x - 1978,6 \cdot y = 99,5$$

oder da die Zahlen links 13 als gemeinschaftlichen Theiler haben, so kann man schreiben (indem 995 nicht ein genaues vielfaches von 13 ist, also eine strenge Lösung nicht möglich ist)

$$1543 \cdot x - 1522 \cdot y = 76$$

Die Näherungsbrüche von $\frac{1522}{1543}$ sind nun

$$\frac{1}{1} \quad \frac{72}{73} \quad \frac{145}{147}$$

Nimmt man 72 und 73 für U und U_1 , so wird jetzt die Gleichung
 $73 x - 72 y = 4$
 und es folgen die Lösungen $x = 4 \quad y = 4$.

Geht man von dem Zeitpunkte 1878 Juni 24,5, in dem sich (48) am Orte der Proximität befand, um 4 Umläufe desselben zurück, so gelangt man zu

1856 Juli 6

(202) befand sich dagegen 1878 März 17,0 am Orte der Proximität. Um 4 Umläufe früher d. i.

1856 Juli 16

würde er sich ebenfalls in der Proximität befunden haben. Man würde hiernach für diese Zeit (1856 Juli 11) eine zeitliche Proximität der Planeten Doris — Chryseis annehmen können, die ungefähr 1 Jahr vor der Entdeckung der Doris durch Goldschmidt stattgefunden hätte. Zugleich geht aus dieser Rechnung hervor, dass die Uebereinstimmung der Oerter der genannten Planeten, wie sie sich in den Jahresephemeriden für 1881 (im Jahrbuch für 1883) fand, noch keine genügende ist, um eine Proximität für diese Zeit anzunehmen.

Der Zeitraum zwischen 2 Proximitäten beträgt, wenn man $\frac{1543}{73}$ d. i. ungefähr 20 Tage Verspätung des einen Planeten gegen den andern nicht in Betracht ziehen will, 72 Umläufe von Doris oder 73 von Chryseis. (Thatsächlich unterscheiden sich diese beiden Zeiten um weniger als 20, nämlich um 13 Tage.) Diese Zwischenzeit von fast 400 Jahren ist bei diesen Planeten wegen der geringen Verschiedenheit ihrer mittleren Bewegungen besonders gross.⁶⁴⁾

⁶⁴⁾ Der vor $\frac{72}{73}$ vorhergehende Näherungsbruch ist $\frac{1}{1}$. Die beiden Umlaufzeiten unterscheiden sich allerdings auch nur um 37^d, doch kann man nicht wohl viel über 10^d hinausgehen, wenn von einer Proximität die Rede sein soll. (cf. Littrow, Denkschr. XVI, pag. 76.)

6. Dauer der Proximität (pag. 41).

Für die Proximität sind die mittleren Anomalieen

$$M^{\circ} 202^{\circ} 9,5 \quad M_1^{\circ} 134^{\circ} 46,6$$

für eine um 20 Tage spätere Zeit ergeben sie sich

$$M 205 44,9 \quad M_1 138 24,9$$

Durch Auflösung der Kepler'schen Gleichung erhält man die zugehörigen excentrischen Anomalieen

$$E 204 13,4 \quad E_1 141 51,1$$

und nunmehr in ganz analoger Weise wie unter 4. (auf pag. 57) die Distanz der beiden Orte $\lg D' = 9,5336$

Da ferner $\lg \Delta = 7,8565$ gefunden wurde, so ergibt sich mit Hilfe Gauss'scher Logarithmen

$$\begin{array}{r} 1,6677 \text{ der log der Differenz} \\ \lg (D' - \Delta) \quad 9,5242 \\ \lg (20)^2 \quad 2,6021 \text{ Mithin ergibt sich} \\ \lg f \quad 6,9221 \end{array}$$

Ist also die Zeit gesucht, innerhalb deren sich die Distanz unter der Grösse 0,05 hält, so ist in der Gleichung $D = \Delta + f(t - t^0)^2$ (pag. 30) $D = 0,05$ zu setzen.

$$D = 0,050$$

$$\Delta = 0,007$$

$$\lg 0,043 = 8,6335$$

$$\lg f \quad 6,9221$$

$$\lg (t - t^0)^2 \quad 1,7114$$

$$\lg (t - t^0) \quad 0,8558$$

$$t_1 - t^0 \quad 7,^d 172$$

$$t_1 - t_2 \quad 14,^d 34.$$

Vita.

Andreas Guilelmus Godofredus Galle natus sum Vratislaviae a. d. X. kal. Jul. anni h. s. LVIII patre Joanne Godofredo professore p. o. direttore observatorii regii et matre Maria e gente Regembrecht. Fidem profiteor evangelicam. Gymnasium frequentavi Mariae Magdalenae sanctum, cujus praeceptoribus benevolentissimis doctissimisque maximam ego gratiam habeo. Vere a. h. s. LXXVII testimonium maturitatis adeptus in numerum civium academicorum clarissimae Georgiae Augustae receptus sum. Tribus semestribus peractis Gottinga in patriam redii in universitate Viadrina studiis me traditurus, ubi, uno semestri quo Berolini scholas mathematicorum adii, excepto, literarum studia absolvi. Post autumnum a. h. s. LXXX observatorii regii assistentis munere usque ad hoc tempus functus sum.

Scholas frequentavi vir. ill. Auerbach, Baumann, H. Bruns, F. Cohn, Dilthey, Dorn, Drude, Ehlers, Enneper, Foerster, Galle, Goedeke, G. Kirchhoff, Klinkerfues, Kummer, Liebisch, Loewig, Lotze (†), O. E. Meyer, Partsch, Riecke, Rosanes, Schottky, Schroeter, H. A. Schwarz, Stern, Tietjen, Ueberhorst, Th. Weber.

Per quatuor semestria Gottingae, Vratislaviae, Berolini seminarii mathematici et physici sodalis fui, per bis sex menses Gottingae et Vratislaviae in laboratorio physico experimentis operam navavi, per unum semestre Vratislaviae cursui anatomiae botanicae adfui.

Magistris meis semper colendis qui magna omnes benevolentia me adjuverunt et literarum amorem in me excitaverunt et foverunt, gratias ago quam maximas.

Thesen.

1. Der gegenwärtige Stand der Wissenschaft gestattet keine Bestimmung der Rotationszeit der Sonne aus der Umlaufzeit ihrer Flecken.
 2. Es ist empfehlenswerth ausser den üblichen Howard'schen Wolkenbezeichnungen in Anlehnung an Poëy noch die Benennungen Pallium, Cirropallium, Cumulopallium einzuführen.
 3. Der Ausdruck, dass eine Grösse unendlich klein sei, hat in den Anwendungen der Differentialrechnung nur eine relative Bedeutung.
 4. Die Staudt'sche Definition projectivischer Gebilde hat Vorzüge vor der Steiner'schen.
 5. Das Streben nach Objectivität ist die Grundbedingung jeder Geschichtsschreibung.
-

